

УДК 517.95

О ВОЛЬТЕРРОВОСТИ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ  
С УСЛОВИЯМИ ТИПА БИЦАДЗЕ —  
САМАРСКОГО ДЛЯ СМЕШАННОГО  
ПАРАБОЛО–ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ  
А. С. Бердышев

**Аннотация:** Рассмотрены задачи с условиями типа Бицадзе — Самарского для смешанного парабола-гиперболического уравнения с нехарактеристической линией изменения типа. Доказаны теоремы об однозначной разрешимости в смысле регулярного и сильного решения а также вольтерровость поставленных задач.

**Ключевые слова:** парабола-гиперболические уравнения, задача Бицадзе — Самарского, разрешимость, вольтерровость.

В 1969 г. А. В. Бицадзе и А. А. Самарский [1] сформулировали и исследовали новую задачу для равномерно-эллиптического уравнения. Отличие этой задачи от других состоит в том, что граничные значения искомого решения повторяются во внутренних точках области, где искомая функция должна удовлетворять уравнению. После этой работы появился ряд работ, посвященных задачам типа Бицадзе — Самарского для многих видов уравнений в различных формулировках, среди которых следует выделить работы В. А. Ильина и Е. И. Моисеева [2], М. С. Салахитдинова и А. К. Уринова [3] и многих других.

Несмотря на большое количество работ, посвященных задачам типа Бицадзе — Самарского, в математической литературе не встречаются задачи для уравнения смешанного типа с условием, связывающим значения искомого решения на характеристике и на произвольной монотонной кривой, лежащей строго внутри характеристического треугольника.

В связи с этим возникают естественные вопросы: можно ли сформулировать аналогичные задачи для смешанного парабола-гиперболического уравнения с нехарактеристическими линиями изменения типа? Существуют ли среди таких задач вольтерровые задачи?

Спектральные свойства (в том числе и вольтерровость) краевых задач для парабола-гиперболического уравнения изучены в работах [4–8].

Данная работа посвящена изучению одного класса задач с условиями типа Бицадзе — Самарского для смешанного парабола-гиперболического уравнения второго порядка с двумя независимыми переменными.

Основным результатом работы является доказательство вольтерровости задач с условиями типа Бицадзе — Самарского для смешанного парабола-гиперболического уравнения с нехарактеристической линией изменения типа.

Рассмотрим уравнение

$$Lu = f(x, y), \quad (1)$$

где

$$Lu = \begin{cases} u_x - u_{yy}, & y > 0, \\ u_{xx} - u_{yy}, & y < 0, \end{cases} \quad (2)$$

в конечной односвязной области  $\Omega$  плоскости независимых переменных  $x, y$ , ограниченной при  $y > 0$  отрезками  $AA_0, A_0B_0, BB_0$  прямых  $x = 0, y = 1, x = 1$  соответственно, а при  $y < 0$  — характеристиками  $AC: x + y = 0$  и  $BC: x - y = 1$  уравнения (1).

Пусть гладкая кривая  $AD: y = -\gamma(x), 0 < x < l$ , где  $0, 5 < l < 1, \gamma(0) = 0, l + \gamma(l) = 1$ , расположена внутри характеристического треугольника  $0 \leq x + y \leq x - y \leq 1$ . Относительно кривой  $AD$  всюду в дальнейшем предположим, что  $\gamma(x)$  дважды непрерывно дифференцируемая и функции  $x - \gamma(x)$  и  $x + \gamma(x)$  монотонно возрастают;  $0 < \gamma'(0) < 1, \gamma(x) > 0, x > 0$ .

Обозначим  $\Omega_0 = \Omega \cap \{y > 0\}, \Omega_1 = \Omega \cap \{y < 0\}$ , а через  $W_2^1(\Omega)$  — пространство Соболева со скалярным произведением  $(\cdot, \cdot)_l$  и нормой  $\|\cdot\|_l, W_2^0(\Omega) \equiv L_2(\Omega)$  — пространство квадратично суммируемых в  $\Omega$  функций.

**Задача  $TM_1$ .** Найти решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям

$$u|_{AA_0 \cup A_0B_0} = 0, \quad (3)$$

$$[u_x - u_y](\theta_0(t)) + \mu(t)[u_x - u_y](\theta^*(t)) = 0, \quad (4_1)$$

где  $\theta_0(t)$  ( $\theta^*(t)$ ) — абсцисса точки пересечения характеристики  $AC$  (кривой  $AD$ ) с характеристикой, выходящей из точки  $(t, 0), 0 < t < 1, \mu(t)$  — заданная функция.

В случае, когда  $\mu(t) \equiv 0$ , задача  $TM_1$  совпадает с задачей Трикоми для парабола-гиперболического уравнения с нехарактеристической линией изменения типа. В этом случае задача  $TM_1$  рассматривалась в работах [9] (регулярная разрешимость), [10] (сильная разрешимость) и [8] (единственность решения задачи для уравнения с комплексными коэффициентами), а когда  $\mu(t) = \infty$ , т. е. когда на кривой  $AD$  задаются условия  $u_x - u_y|_{AD} = 0$ , сильная разрешимость и вольтерровость задачи  $TM_1$  изучались в [7].

**Задача  $TM_2$ .** Найти решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям (3) и

$$[u_x - u_y](\theta_0(t)) + \mu(t)[u_x + u_y](\theta^*(t)) = 0. \quad (4_2)$$

**Задача  $TM_3$ .** Найти решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям (3) и

$$\frac{d}{dt}u[\theta_0(t)] + \mu(t)\frac{d}{dt}u[\theta^*(t)] = 0. \quad (4_3)$$

Отметим, что если  $\mu(t) = \mu = \text{const}$ , то условие (4<sub>3</sub>) эквивалентно следующему условию:

$$u[\theta_0(t)] + \mu(t)u[\theta^*(t)] = 0,$$

которое поточечно связывает значения искомого решения на характеристике со значением решения на некоторой кривой, лежащей строго внутри области.

Под *регулярным решением* задачи  $TM_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ) будем понимать функцию  $u(x, y) \in W$ , где

$$W = C(\bar{\Omega}) \cap C^1(\Omega \cup AC) \cap C^{1,2}(\Omega_0) \cap C^{2,2}(\Omega_1),$$

удовлетворяющую уравнению (1) в  $\Omega_0 \cup \Omega_1$  и условиям (3) и (4<sub>*i*</sub>) ( $i = 1, 2, 3$ ).

Функцию  $u(x, y) \in L_2(\Omega)$  назовем *сильным решением* задачи  $TM_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ), если существует последовательность функций  $\{u_n\}, u_n \in W$ , удовлетворяющих условиям (3) и (4<sub>*i*</sub>) ( $i = 1, 2, 3$ ), такая, что  $\|u_n - u\|_0 \rightarrow 0, \|Lu_n - f\|_0 \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow \infty$ .

**Теорема 1.1.** Пусть  $\mu(t) \in C^2[0, 1]$  и  $\mu(t) \neq -1$ ,  $0 \leq t \leq 1$ . Тогда для любой функции  $f(x, y) \in C^1(\bar{\Omega})$ ,  $f(A) = 0$ , существует единственное регулярное решение задачи  $TM_1$ , которое удовлетворяет неравенству

$$\|u\|_1 \leq c\|f\|_0 \quad (5)$$

и представимо в виде

$$u(x, y) = \iint_{\Omega} K_i(x, y; x_1, y_1) f(x_1, y_1) dx_1 dy_1, \quad i = 1, 2, 3, \quad (6_i)$$

где  $K_i(x, y; x_1, y_1) \in L_2(\Omega \times \Omega)$  (для задачи  $TM_1$   $i = 1$ ).

В (5) и в дальнейшем через  $c$  будем обозначать положительную постоянную, не зависящую от  $u(x, y)$ , не обязательно одну и ту же.

**Теорема 1.2.** Пусть выполнены условия теоремы 1.1. Тогда для любой функции  $f(x, y) \in L_2(\Omega)$  существует единственное сильное решение задачи  $TM_1$ . Это решение принадлежит классу

$$C(\bar{\Omega}) \cap W_2^1(\Omega) \cap W_2^{1,2}(\Omega_0), \quad (7),$$

удовлетворяет неравенству (5) и может быть представлено в виде (6<sub>1</sub>).

Для корректности и вольтерровости задачи  $TM_2$  в отличие от задачи  $TM_1$  решающее значение имеет соотношение между коэффициентом «сжатия»  $\mu(0)$  в начале координат производной по направлению характеристики  $BC$  и полярным углом  $\alpha$ , образуемым кривой  $AD$  с осью абсцисс.

**Теорема 2.1.** Пусть выполнено условие

$$\mu(t) \in C^2[0, 1] \text{ и } |\mu(0)|^2 < \operatorname{tg}(\alpha + \pi/4), \quad -\pi/4 < \alpha < 0. \quad (8)$$

Тогда для любой функции  $f(x, y) \in C^1(\bar{\Omega})$ ,  $f(A) = 0$ , существует единственное регулярное решение задачи  $TM_2$ , которое удовлетворяет неравенству (5) и представимо в виде (6<sub>i</sub>),  $i = 2$ .

**Теорема 2.2.** Пусть выполнено условие (8). Тогда для любой функции  $f(x, y) \in L_2(\Omega)$  существует единственное сильное решение задачи  $TM_2$ . Это решение принадлежит классу (7), удовлетворяет неравенству (5) и может быть представлено в виде (6<sub>2</sub>).

**Теорема 3.1.** Пусть  $\mu(t) \in C^2[0, 1]$ ,  $\mu(t) \neq -1$ ,  $0 \leq t \leq 1$ , и

$$\left| \frac{\mu(0)}{1 + \mu(0)} \right|^2 < \operatorname{ctg}(\alpha + \pi/4), \quad -\pi/4 < \alpha < 0. \quad (9)$$

Тогда для задачи  $TM_3$  справедливы все утверждения теорем 2.1 и 2.2.

Через  $\mathbb{L}_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ) обозначим замыкание в пространстве  $L_2(\Omega)$  дифференциального оператора, заданного на  $W$ , элементы которого удовлетворяют условиям (3) и (4<sub>i</sub>) ( $i = 1, 2, 3$ ), выражением (2).

Согласно определению сильного решения задачи  $TM_i$   $u(x, y)$  — сильное решение задачи  $TM_i$  тогда и только тогда, когда  $u(x, y) \in D(\mathbb{L}_i)$ , где  $D(\mathbb{L}_i)$  — область определения оператора  $\mathbb{L}_i$ .

Из вышеприведенных теорем при выполнении соответствующих условий следует, что каждый оператор  $\mathbb{L}_i$  замкнутый и его область определения плотна

в  $L_2(\Omega)$ ; обратный оператор  $\mathbb{L}_i^{-1}$  определен на всем  $L_2(\Omega)$  и вполне непрерывный ( $i = 1, 2, 3$ ).

Поэтому возникает естественный вопрос о существовании собственных значений оператора  $\mathbb{L}_i^{-1}$ , а следовательно, и задачи  $TM_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ).

Основным результатом данной работы являются следующие теоремы об отсутствии собственных значений операторов  $\mathbb{L}_i^{-1}$  ( $i = 1, 2, 3$ ).

**Теорема 1.3.** Пусть  $\mu(t) \neq -1$ ,  $0 \leq t \leq 1$ . Тогда интегральный оператор в правой части (6<sub>1</sub>) является вольтерровым в  $L_2(\Omega)$  (вполне непрерывным и квазинильпотентным).

**Теорема 2.3.** Пусть выполнено условие (8). Тогда задача  $TM_2$  является вольтерровой, т. е. для любого комплексного числа  $\lambda$  решение уравнения  $\mathbb{L}_2 u - \lambda u = f(x, y)$  существует и единственно при всех  $f(x, y) \in L_2(\Omega)$ .

**Теорема 3.2.** Пусть выполнены условия теоремы 3.1. Тогда обратный оператор

$$\mathbb{L}_3^{-1} f(x, y) = \iint_{\Omega} K_3(x, y; x_1, y_1) f(x_1, y_1) dx_1 dy_1$$

оператора задачи  $TM_3$  является вольтерровым.

Из теорем 1.3, 2.3, 3.2 легко следует пустота множества собственных значений задач  $TM_i$ ,  $i = 1, 2, 3$ .

Отметим, что для корректности (вольтерровости) задач  $TM_2$  и  $TM_3$  условия (8) и (9) существенны. Например, при нарушении условия (8) решение задачи  $TM_2$  не единственно, т. е. ноль является собственным значением задачи  $TM_2$ .

Доказательство теорем 1.1–1.3 приведено в работе [11].

Рассмотрим задачу  $TM_2$ . В силу однозначной разрешимости первой краевой задачи для уравнения теплопроводности решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям (3), в области  $\Omega_0$  представимо в виде

$$u(x, y) = \int_0^x dx_1 \int_0^1 G(x - x_1, y, y_1) f(x_1, y_1) dy_1 + \int_0^x G_{y_1}(x - x_1, y, 0) \tau(x_1) dx_1, \quad (10)$$

где  $\tau(x) = u(x, 0)$ ,  $\tau(0) = 0$ , а  $G(x - x_1, y, y_1)$  — функция Грина первой краевой задачи для уравнения теплопроводности в квадрате  $AA_0BB_0$ , представляемая в виде

$$G(x, y, y_1) = \frac{1}{2\sqrt{\pi x}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left\{ \exp\left[-\frac{(y - y_1 + 2n)^2}{4x}\right] - \exp\left[-\frac{(y + y_1 + 2n)^2}{4x}\right] \right\}.$$

Вычислив производную  $\frac{\partial u}{\partial y}$  в (10) и устремив  $y$  к нулю, получим соотношение между  $\tau(x)$  и  $\nu(x) = u_y(x, 0)$ , принесенное на  $AB$  из параболической части области  $\Omega$ :

$$\nu(x) = - \int_0^x k(x - t) \tau'(t) dt + \Phi_0(x), \quad (11)$$

где

$$k(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi x}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{n^2}{x}\right),$$

$$\Phi_0(x) = \int_0^x dx_1 \int_0^1 G_y(x - x_1, y, y_1)|_{y=0} f(x_1, y_1) dy_1. \quad (12).$$

В силу однозначной разрешимости задачи Коши для волнового уравнения, любое регулярное решение задачи  $TM_2$  в области  $\Omega_1$  ищем в виде

$$u(x, y) = \frac{1}{2} \left[ \tau(\xi) + \tau(\eta) - \int_{\xi}^{\eta} \nu(t) dt \right] - \int_{\xi}^{\eta} d\xi_1 \int_{\xi_1}^{\eta} f_1(\xi_1, \eta_1) d\eta_1, \quad (13)$$

где

$$\xi = x + y, \quad \eta = x - y, \quad 4f_1(\xi, \eta) = f\left(\frac{\xi + \eta}{2}, \frac{\xi - \eta}{2}\right).$$

Вследствие условий, наложенных на функцию  $\gamma(x)$ , уравнение кривой  $AD$  в характеристических переменных допускает представление  $\xi = \lambda(\eta)$ ,  $0 \leq \eta \leq 1$ , причем  $0 < \lambda'(0) < 1$ ,  $\lambda(\eta) < \eta$ .

Удовлетворяя в (13) условию (4<sub>2</sub>), получим основное соотношение между  $\tau(x)$  и  $\nu(x)$ , принесенное на отрезок  $AB$  из гиперболической части  $\Omega_1$ :

$$\tau'(x) + \mu(t)\tau'(\lambda(t)) - \nu(t) + \mu(t)\nu(\lambda(t)) = F_1(x), \quad (14)$$

где

$$F_1(t) = 2 \int_0^t f_1(\xi_1, t) d\xi_1 - 2\mu(t) \int_{\lambda(t)}^t f(\lambda(t), \eta_1) d\eta_1. \quad (15)$$

Теперь, исключая из соотношений (11) и (14) функцию  $\nu(x)$ , имеем для  $\tau'(x)$  интегрофункциональное уравнение

$$\tau'(t) + \mu(t)\tau'(\lambda(t)) + \int_0^x k(t-z)\tau'(z) dz - \mu(t) \int_0^{\lambda(t)} k(\lambda(t)-z)\tau'(z) dz = F(t), \quad 0 \leq t \leq 1, \quad (16)$$

где

$$F(t) = F_1(t) + \Phi_0(t) - \mu(t)\Phi_0(\lambda(t)). \quad (17)$$

Таким образом, задача  $TM_2$  в смысле однозначной разрешимости эквивалентно редуцирована к уравнению (16).

Рассмотрим уравнение

$$\varphi(x) + \mu(x)\varphi(\lambda(x)) = F_2(x). \quad (18)$$

Сначала приведем следующую лемму, необходимую нам в дальнейшем.

**Лемма 1.** Пусть

$$|\mu(0)|^2 < \lambda'(0). \quad (19)$$

Тогда для любой функции  $F_2(x) \in L_2(0, 1)$  существует единственное решение  $\varphi(x) \in L_2(0, 1)$  уравнения (18), которое удовлетворяет неравенству

$$\|\varphi(x)\|_{L_2(0,1)} \leq c \|F_2(x)\|_{L_2(0,1)}. \quad (20)$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Введем в рассмотрение оператор, действующий по формуле

$$A\varphi(x) = \mu(x)\varphi(\lambda(x)). \quad (21)$$

Очевидно, что

$$A^n \varphi(x) = \prod_{k=0}^{n-1} \mu(\lambda^k(x)) \cdot \varphi(\lambda^n(x)), \quad n \geq 2,$$

где  $\lambda^n(x) = \lambda[\lambda^{n-1}(x)]$ ,  $\lambda^0(x) = x$ .

Нетрудно установить, что оператор  $B^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k A^k$  является формально обратным к оператору  $B = E + A$ , где  $E$  — тождественный оператор. Покажем ограниченность оператора  $B^{-1} = (E + A)^{-1}$  в пространстве  $L_2(0, 1)$ .

В силу (21) после некоторых преобразований легко установить, что

$$\|A^n \varphi(x)\|_{L_2(0,1)}^2 \leq \prod_{k=0}^{n-1} \max_{0 \leq x \leq \lambda^k(1)} \frac{\mu^2(x)}{|\lambda'(x)|} \cdot \|\varphi(x)\|_{L_2(0,1)}^2.$$

Поэтому  $\|A^n\|_{L_2(0,1) \rightarrow L_2(0,1)} \leq a_n$ , где

$$a_n = \prod_{k=0}^{n-1} \max_{0 \leq x \leq \lambda^n(1)} \frac{|\mu(x)|}{\sqrt{|\lambda'(x)|}}.$$

Так как  $\lambda(x) < x$  при  $x \neq 0$  и  $\lambda(0) = 0$ , последовательность  $\lambda^n(1)$  монотонно стремится к нулю при  $n \rightarrow \infty$ . Отсюда в силу (19) следует неравенство

$$\|B^{-1}\|_{L_2(0,1) \rightarrow L_2(0,1)} \leq M, \quad \text{где } M = \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty,$$

что и показывает ограниченность оператора  $B^{-1}$  в  $L_2(0, 1)$  и справедливость оценки (20). Лемма 1 доказана.

**Лемма 2.** Пусть

$$|\mu(0)|\lambda'(0) < 1. \tag{22}$$

Тогда если  $F_2(x) \in C^1[0, 1]$  и  $F_2(0) = 0$ , то существует единственное решение уравнения (18) из класса  $C^1[0, 1]$  и  $\varphi(0) = 0$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЕММЫ 2 с учетом (22) проводится по аналогии с доказательством леммы 1 в пространстве  $C^1[0, 1]$ .

С учетом (12), (15), (17) нетрудно установить справедливость следующих лемм.

**Лемма 3.** Если  $\mu(t) \in C^2[0, 1]$  и  $f(x, y) \in C^1(\bar{\Omega})$ ,  $f(A) = 0$ , то  $F(t) \in C^1[0, 1]$  и  $F(0) = 0$ .

**Лемма 4.** Если  $\mu(t) \in C^2[0, 1]$  и  $f(x, y) \in L_2(\Omega)$ , то  $F(t) \in L_2(0, 1)$  и  $\|F(t)\|_{L_2(0,1)} \leq c\|f\|_0$ .

**Лемма 5.** Пусть выполнено условие (19). Тогда для любой функции  $F(x) \in L_2[0, 1]$  существует единственное решение уравнения (16). Это решение принадлежит классу  $L_2(0, 1)$  и удовлетворяет неравенству

$$\|\tau'(x)\|_{L_2(0,1)} \leq c\|F(x)\|_{L_2(0,1)}. \tag{23}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Введем в рассмотрение интегральный оператор  $T$ , действующий в  $L_2(0, 1)$  по формуле

$$T\varphi(x) = \int_0^x k(x-t)\varphi(t) dt. \tag{24}$$

Очевидно (так как  $\sqrt{x}k(x)$  — непрерывная функция), что  $T$  — вполне непрерывный оператор в  $L_2(0, 1)$ .

С учетом (21) и (24) из (16), переходя к операторной записи, получим

$$[E + A]\tau'(x) + [E - A]T\tau'(x) = F(x). \quad (25)$$

В силу леммы 1 существует ограниченный оператор  $(E + A)^{-1}$ . Применяя к (25) оператор  $(E + A)^{-1}$ , имеем

$$\tau'(x) = (E + A)^{-1}F(x) + (E + A)^{-1}(E - A)T\tau'(x). \quad (26)$$

Уравнение (26) будем решать методом последовательных приближений. Положим  $\tau'_0(x) = 0$ ,

$$\tau'_n(x) = (E + A)^{-1}F(x) + (E + A)^{-1}(E - A)T\tau'_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots \quad (27)$$

В случае, когда  $n = 1$ , из леммы 1 следует, что

$$\|\tau'_1(x)\|_{L_2(0,1)} \leq \|(E + A)^{-1}\|_{L_2(0,1) \rightarrow L_2(0,1)} \|F(x)\|_{L_2(0,1)} \leq M \|F(x)\|_{L_2(0,1)}. \quad (28)$$

Непосредственным вычислением можно доказать справедливость следующих оценок:

$$\|T\|_{L_2(0,1) \rightarrow L_2(0,1)} \leq N, \quad \|E - A\|_{L_2(0,1) \rightarrow L_2(0,1)} \leq L, \quad (29)$$

где

$$N^2 = 4 + \max_{0 \leq x \leq 1} \left| k(x) - \frac{1}{\sqrt{\pi x}} \right|, \quad L = 1 + \max_{0 \leq x \leq 1} \frac{|\mu(x)|}{\sqrt{|\lambda'(x)|}}.$$

Имеет место оценка

$$\|\tau'_n(x) - \tau'_{n-1}(x)\|_{L_2(0,1)} \leq \frac{M^n (LN)^{n-1}}{n!} \|F(x)\|_{L_2(0,1)}.$$

Доказательство следует из оценок (28), (29) и из уравнений (27). Из последнего вытекает сходимость в  $L_2(0, 1)$  ряда

$$\tau'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \tau'_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} [\tau'_n(x) - \tau'_{n-1}(x)], \quad (30)$$

который мажорируется в  $L_2(0, 1)$  сходящимся числовым рядом

$$\|F(x)\|_{L_2(0,1)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{M^n (LN)^{n-1}}{n!}.$$

Пользуясь ограниченностью операторов  $A$  и  $T$ , в силу сходимости ряда (30) нетрудно убедиться, что построенная функция  $\tau'(x)$  удовлетворяет уравнению (26) и решение уравнения (26) единственно. Лемма 5 доказана.

С учетом того, что  $T$  как оператор со слабой особенностью вполне непрерывен из  $L_2(0, 1)$  в  $C[0, 1]$ , а  $A$  — ограниченный оператор в  $C[0, 1]$ , с помощью леммы 2 можно доказать следующую лемму.

**Лемма 6.** Пусть  $F(x) \in C^1[0, 1]$  и  $F(0) = 0$ . Тогда если  $\tau'(x) \in L_2(0, 1)$  — решение уравнения (16), то  $\tau'(x) \in C^1[0, 1]$  и  $\tau'(0) = 0$ .

**Лемма 7.** Пусть выполнено условие леммы 2. Тогда для любой функции  $F(t) \in C^1[0, 1]$ ,  $F(0) = 0$ , существует единственное решение уравнения (16) и  $\tau'(x) \in C^1[0, 1]$  и  $\tau'(0) = 0$ .

Доказательство леммы 7 следует из лемм 5 и 6.

Доказательство теорем 2.1 и 2.2 вытекает из лемм 1–7. Действительно, если  $f(x, y) \in C^1(\bar{\Omega})$  и  $f(A) = 0$ , то в силу лемм 3 и 7 имеем  $\tau(x) \in C^2[0, 1]$ , а из (11) —  $\nu(x) \in C^1[0, 1]$ .

Если  $f(x, y) \in L_2(\Omega)$ , то ввиду лемм 4 и 5 будет  $\tau(x) \in W_2'(0, 1)$  и  $\nu(x) \in L_2(0, 1)$ .

Теперь согласно формулам (10) и (13), поступая так же, как и в работе [6], получаем все утверждения теорем 2.1 и 2.2, кроме (6<sub>2</sub>).

Для завершения доказательства покажем, что для любой функции  $f(x, y) \in L_2(\Omega)$  сильное решение задачи  $TM_2$  представимо в виде (6<sub>2</sub>).

В силу того, что  $(E + A)^{-1}(E - A) = -E + 2(E + A)^{-1}$ , с учетом (24) уравнение (26) можно представить в виде

$$\tau'(x) - \int_0^x M(x-t)\tau'(t) dt = \Phi(x), \quad (31)$$

где

$$\Phi(x) = (E + A)^{-1}F(x) = (E + A)^{-1}F_1(x) - \Phi_0(x) + 2(E + A)^{-1}\Phi_0(x), \quad (32)$$

$$M(x-t) = K(x-t) - 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \theta(\lambda^n(x)-t) \prod_{k=0}^{n-1} \mu(\lambda^k(x)-t) K(\lambda^n(x)-t), \quad (33)$$

$$\theta(x) = 1, \quad x > 0, \quad \theta(x) = 0, \quad x < 0.$$

Решение уравнения (31) представим в виде

$$\tau'(x) = \Phi(x) + \int_0^x \Gamma_0(x, t)\Phi(t) dt,$$

где  $\Gamma_0(x, t)$  — резольвента ядра (33) интегрального уравнения (31).

С учетом того, что  $\tau(0) = 0$ , имеем

$$\tau(x) = \int_0^x \Gamma_1(x, t)\Phi(t) dt.$$

Здесь  $\Gamma_1(x, t) = \int_t^x \Gamma_0(z, t) dz + 1$ .

Теперь в (10) и (13), с учетом (11), (12), (15), (17), (32) и (33), произведя необходимые вычисления, получим (6<sub>2</sub>). В формуле (6<sub>2</sub>)

$$K_2(x, y; x_1, y_1) = \theta(y)\theta(y_1)K_{00}(x, y; x_1, y_1) + \theta(y)\theta(-y_1)K_{01}(x, y; x_1, y_1) + \theta(-y)\theta(y_1)K_{10}(x, y; x_1, y_1) + \theta(-y)\theta(-y_1)K_{11}(x, y; x_1, y_1),$$

где

$$K_{00}(x, y; x_1, y_1) = \theta(x-x_1)G(x-x_1, y, y_1) + \int_0^1 \theta(x-t)G_\eta(x-t, y, \eta)|_{\eta=0} M_1(t, x_1, y_1) dt,$$



$$K_{01}(x, y; x_1, y_1) = \frac{1}{2} \int_0^1 \theta(x-t) G_\eta(x-t, y, \eta) |_{\eta=0} N_1(t, \xi_1, \eta_1) dt,$$

$$\xi_1 = x_1 + y_1, \quad \eta_1 = x_1 - y_1,$$

$$M_i(x, x_1, y_1) = -\theta(x-x_1) \int_{x_1}^x \Gamma_i(x, t) G_y(t-x, 0, y_1) dt$$

$$+ 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \theta(\lambda^n(x)-t) \int_{x_1}^{\lambda(x)} \Gamma_i(x, \delta^n(t)) \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\mu(\delta^{n-k}(t))}{\lambda'(\delta^{n-k}(t))} G_y(t-x, 0, y_1) dt,$$

$$N_i(x, \xi_1, \eta_1) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[ \theta(\lambda^n(x) - \xi_1) \theta(\lambda^n(x) - \eta_1) \right.$$

$$\times \Gamma_i(x, \delta^n(\eta_1)) \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\mu(\delta^{n-k}(\eta_1))}{\lambda'(\delta^{n-k}(\eta_1))} - \theta(\lambda^{n+1}(x) - \xi_1) \theta(\delta(\xi_1) - \eta_1)$$

$$\left. \times \Gamma_i(x, \delta^{n+1}(\xi_1)) \prod_{k=0}^n \frac{\mu(\delta^{n+1-k}(\xi_1))}{\lambda'(\delta^{n+1-k}(\xi_1))} \right], \quad i = 0, 1.$$

Здесь  $\xi = \lambda(\eta)$ ,  $0 < \eta < 1$ , или  $\eta = \delta(\xi)$ ,  $0 < \xi < \xi_0 = \lambda(1)$ , — уравнения кривой  $AD$  в характеристических координатах  $\xi = x + y$ ,  $\eta = x - y$ ,  $\delta^n(t) = \delta(\delta^{n-1}(t))$ ,  $\delta^0(t) = t$ ,

$$K_{10}(x, y; x_1, y_1) = M_1(\xi, x_1, y_1) + \frac{1}{2} \int_0^{\lambda(\xi)} K_1(t, \xi, \eta) M_0(t, x_1, y_1) dt$$

$$+ \frac{1}{2} \int_{\lambda(\xi)}^{\lambda(\eta)} \left[ K_1(t, \delta(t), \eta) - \frac{\mu(\delta(t))}{\lambda'(\delta(t))} \right] M_0(t, x_1, y_1) dt$$

$$- \frac{1}{2} \int_0^{\lambda(\xi)} \theta(t-x_1) K_1(t, \xi, \eta) G_y(t-x_1, 0, y_1) dt$$

$$- \frac{1}{2} \int_{\lambda(\xi)}^{\lambda(\eta)} \theta(t-x_1) K_1(t, \delta(t), \eta) G_y(t-x_1, 0, y_1) dt$$

$$+ \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left\{ \int_0^{\lambda^{(n+1)}(\xi)} \theta(t-x_1) K_1(\delta^n(t), \xi, \eta) \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\mu(\delta^{n-k}(t))}{\lambda'(\delta^{n-k}(t))} G_y(t-x_1, 0, y_1) dt \right.$$

$$+ \int_{\lambda^{(n+1)}(\xi)}^{\lambda^{(n+1)}(\eta)} \theta(t-x_1) \left[ K_1(\delta^n(t), \delta^{n+1}(t), \eta) - \frac{\mu(\delta^{n+1}(t))}{\lambda'(\delta^{n+1}(t))} \right]$$

$$\left. \times \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\mu(\delta^{n-k}(t))}{\lambda'(\delta^{n-k}(t))} G_y(t-x_1, 0, y_1) dt \right\},$$

$$K_1(t, \xi, \eta) = \int_{\xi}^{\eta} \mu(z)K(\lambda(z) - t) dt,$$

$$\begin{aligned} K_{11}(x, y; x_1, y_1) &= \theta(\eta - \eta_1)\theta(\eta_1 - \xi) - \theta(\lambda(\eta) - \xi_1)\theta(\xi_1 - \lambda(\xi)) \\ &\times \theta(\delta(\xi_1) - \eta_1) \frac{\mu(\delta(\xi_1))}{\lambda'(\delta(\xi_1))} + N_1(x, \xi_1, \eta_1) + \frac{1}{2} \int_0^{\lambda(\xi)} K_1(t, \xi, \eta) N_0(t, \xi_1, \eta) dt \\ &+ \frac{1}{2} \int_{\lambda(\xi)}^{\lambda(\eta)} [K_1(t, \delta(t), \eta) - \frac{\mu(\delta(t))}{\lambda'(\delta(t))}] N_0(t, \xi_1, \eta_1) dt \\ &+ \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left\{ \theta(\lambda^{n+1}(\xi) - \eta_1) K_1(\delta^n(\eta_1), \xi, \eta) \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\mu(\delta^{n-k}(\eta_1))}{\lambda'(\delta^{n-k}(\eta_1))} \right. \\ &- \theta(\delta(\xi_1) - \eta_1) \theta(\lambda^{n+2}(\xi) - \xi_1) K_1(\delta^{n+1}(\xi_1), \xi, \eta) \prod_{k=0}^n \frac{\mu(\delta^{n+1-k}(\xi_1))}{\lambda'(\delta^{n+1-k}(\xi_1))} \\ &+ \theta(\lambda^{n+1}(\eta) - \eta_1) \theta(\eta_1 - \lambda^{n+1}(\xi)) \left[ K_1(\delta^n(\eta_1), \delta^{n+1}(\eta_1), \eta) - \frac{\mu(\delta^{n+1}(\eta_1))}{\lambda'(\delta^{n+1}(\eta_1))} \right] \\ &\times \prod_{k=0}^n \frac{\mu(\delta^{n-k}(\eta_1))}{\lambda'(\delta^{n-k}(\eta_1))} - \theta(\lambda^{n+2}(\eta) - \xi_1) \theta(\xi_1 - \lambda^{n+2}(\xi)) \theta(\delta(\xi_1) - \eta_1) \\ &\left. \times \left[ K_1(\delta^{n+1}(\xi_1), \delta^{n+2}(\xi_1), \eta) - \frac{\mu(\delta^{n+2}(\xi_1))}{\lambda'(\delta^{n+2}(\xi_1))} \right] \prod_{k=0}^n \frac{\mu(\delta^{n+1-k}(\xi_1))}{\lambda'(\delta^{n+1-k}(\xi_1))} \right\}. \end{aligned}$$

Для завершения доказательства теорем 2.1 и 2.2 отметим, что условия (8) и (19) эквивалентны.

Действительно, из уравнения кривой  $AD$  в характеристических координатах легко следует, что

$$\lambda'(0) = \frac{1 - \gamma'(0)}{1 + \gamma'(0)} = \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{4} + \alpha \right).$$

Теоремы 2.1 и 2.2 доказаны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2.3. В силу теоремы 2.2 обратный оператор  $L_2^{-1}$  задачи  $TM_2$  (оператора  $L_2$ ) существует, определен на всем  $L_2(\Omega)$ , представим в виде

$$L_2^{-1}f(x, y) = \iint_{\Omega} K_2(x, y; x_1, y_1) f(x_1, y_1) dx_1 dy_1$$

и вполне непрерывен. Поэтому остается показать, что  $L_2^{-1}$  квазинильпотентный в  $L_2(\Omega)$ . Для этого воспользуемся критерием вольтерровости интегральных операторов [12].

Из (34) нетрудно заметить, что  $K_2(x, y; x_1, y_1) = 0$ , если  $x < x_1$ . Поэтому из результатов работы [12] получаем, что оператор  $L_2^{-1}$  не имеет собственных значений и в силу полной непрерывности является вольтерровым. Отсюда легко следует утверждение теоремы 2.3.

Теорема 2.3 доказана.

Доказательство теорем 3.1 и 3.2 с учетом (9) проводится аналогично доказательству теорем 2.1–2.3.

Автор выражает глубокую благодарность академикам АН РУз М. С. Салахитдинову и Ш. А. Алимову за полезное обсуждение результатов работ и ряд ценных советов.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Бицадзе А. В., Самарский А. А. О некоторых простейших обобщениях линейных эллиптических краевых задач // Докл. АН СССР. 1969. Т. 185, № 4. С. 739–740.
2. Ильин В. А., Моисеев Е. И. Нелокальная краевая задача для оператора Штурма — Лиувилля в дифференциальной и разностной трактовках // Докл. АН СССР. 1986. Т. 291, № 3. С. 534–539.
3. Салахитдинов М. С., Уринов А. К. Краевые задачи для уравнений смешанного типа со спектральным параметром. Ташкент: ФАН, 1997.
4. Моисеев Е. И., Капустин Н. Ю. О спектральных задачах со спектральным параметром в граничном условии // Дифференц. уравнения. 1997. Т. 33, № 1. С. 115–119.
5. Салахитдинов М. С., Бердышев А. С. Краевые задачи для параболо-гиперболического уравнения в области с отходом от характеристики // Докл. РАН. 1992. Т. 327, № 3. С. 303–305.
6. Салахитдинов М. С., Бердышев А. С. О вольтерровости краевой задачи с отходом от характеристики для параболо-гиперболического уравнения // Узб. мат. журн. 1993. № 3. С. 6–13.
7. Садыбеков М. А., Тойжанова Г. Д. Спектральные свойства одного класса краевых задач для параболо-гиперболического уравнения // Дифференц. уравнения. 1992. Т. 28, № 1. С. 176–179.
8. Сабитов К. Б. К теории уравнений смешанного параболо-гиперболического типа со спектральным параметром // Дифференц. уравнения. 1989. Т. 25, № 1. С. 117–126.
9. Елеев В. А. Аналог задачи Трикоми для смешанных параболо-гиперболических уравнений с нехарактеристической линией изменения типа // Дифференц. уравнения. 1977. Т. 13, № 1. С. 56–63.
10. Капустин Н. Ю. Оценка решения задачи Трикоми для системы уравнений параболо-гиперболического типа // Докл. АН СССР. 1982. Т. 265, № 3. С. 524–525.
11. Эшматов Б. Э. О вольтерровости задач с условиями Бицадзе — Самарского для параболо-гиперболического уравнения // Узб. мат. журн. 2001. № 1. С. 73–78.
12. Нерсесян А. Б. К теории интегральных уравнений типа Вольтерра // Докл. АН СССР. 1964. Т. 155, № 5. С. 1049–1051.

*Статья поступила 19 мая 2004 г.*

*Бердышев Абдумаулен Сулейманович  
Институт Математики АН РУз,  
ул. Ф. Ходжаева, 29, Ташкент 700125, Узбекистан  
mathinst@uzsci.net, berdyshev@mail.ru*