

УДК 517.928

О СУЩЕСТВОВАНИИ ГРАНИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ У ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ

В. П. Михайлов

Аннотация: Устанавливаются критерии существования L_2 -предела и слабого L_2 -предела полигармонической функции на правильной аналитической границе двумерной ограниченной области.

Ключевые слова: полигармоническое уравнение, граничное значение, компактность.

Памяти Тадея Ивановича Зеленьяка

Пусть Q — ограниченная двумерная область, $Q \subset \mathbb{R}_2$, $x = (x_1, x_2)$ — точка области Q , $z = (x_1 + ix_2)$ — ее комплексная координата, и пусть $u(x) = u(z)$ — m -гармоническая, $m > 1$, (полигармоническая) в области Q функция, т. е. функция, являющаяся решением уравнения

$$\Delta^m u = 0, \quad x \in Q. \quad (1)$$

Границу ∂Q области Q будем предполагать правильной аналитической кривой, т. е. такой кривой, что для любой точки $z_0 \in \partial Q$ существует такая ее (комплексная) окрестность U_{z_0} , что уравнение попавшего в эту окрестность куска $\partial Q \cap U_{z_0}$ кривой ∂Q имеет вид $z = \lambda(t)$, $t_1 < t < t_2$, где $\lambda(t)$ — аналитическая функция вещественного переменного $t \in (t_1, t_2)$, $z_0 = \lambda(t_0)$, $t_0 \in (t_1, t_2)$, $t_1 = t_1(z_0)$, $t_2 = t_2(z_0)$, причем $\lambda'(t) \neq 0$ для $t \in (t_1, t_2)$.

Обозначим через

$$w = w(z), \quad z \in Q, \quad (2)$$

функцию, осуществляющую конформное отображение области Q комплексной z -плоскости на единичный круг $\{|w| < 1\}$ комплексной w -плоскости, а через

$$z = z(w), \quad |w| < 1, \quad (3)$$

обратную к ней функцию. Прообраз при преобразовании (2) кольца $\{r_0 \leq |w| < 1\}$ при некотором $r_0 \in (0, 1)$ обозначим через Q_{r_0} . Множество Q_{r_0} состоит из точек кривых γ_r , $r_0 \leq r < 1$, являющихся прообразами окружностей $\{|w| = r\}$:

$$\gamma_r = \{z = z(re^{i\varphi}), \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}, \quad r_0 \leq r < 1. \quad (4)$$

Прообразом окружности $\{|w| = 1\}$ является граница ∂Q области Q , которую по аналогии с (4) естественно также обозначить через γ_1 :

$$\partial Q = \gamma_1 = \{z = z(e^{i\varphi}), \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}.$$

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 01-01-00988) и гранта НШ-1542.2003.1.

Пусть на множестве Q_{r_0} задана некоторая непрерывная функция $g(z)$ (в частности, исследуемая полигармоническая функция $u(z)$). Будем говорить, что функция $g(z)$ имеет L_2 -предел на границе $\partial Q = \gamma_1$, если семейство ее следов на кривых γ_r , $r_0 < r < 1$, т. е. множество функций

$$\{g(z(re^{i\varphi})), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}, \quad r_0 < r < 1, \quad (5)$$

имеет $L_2(0, 2\pi)$ -предел при $r \rightarrow 1 - 0$. Если множество функций (5) имеет слабый $L_2(0, 2\pi)$ -предел при $r \rightarrow 1 - 0$, то говорим, что функция $g(z)$ имеет слабый L_2 -предел на границе ∂Q . Будем также говорить, что функция $g(z)$ L_2 -компактна (слабо L_2 -компактна) вблизи границы ∂Q , если множество ее следов (5) $L_2(0, 2\pi)$ -компактно (соответственно слабо $L_2(0, 2\pi)$ -компактно). Аналогично говорим, что функция $g(z)$ L_2 -ограничена вблизи границы ∂Q , если множество ее следов (5) $L_2(0, 2\pi)$ -ограничено. Свойства функции $g(z)$ быть слабо L_2 -компактной и L_2 -ограниченной вблизи границы, естественно, эквивалентны.

Целью настоящей работы является установление критериев существования L_2 -предела и слабого L_2 -предела полигармонической функции $u(z)$ на границе области Q . А именно, будет установлена справедливость следующих утверждений.

Теорема 1. Для того чтобы полигармоническая функция $u(z)$, $z \in Q$, имела L_2 -предел на границе области Q , необходимо и достаточно, чтобы она была L_2 -компактна вблизи ее границы.

Теорема 2. Для того чтобы полигармоническая функция $u(z)$, $z \in Q$, имела слабый L_2 -предел на границе области Q , необходимо и достаточно, чтобы она была слабо L_2 -компактна вблизи ее границы.

Теоремы 1 и 2 для случая бигармонической функции ($m = 2$) доказаны в работе [1]. Настоящая работа в идейном плане близка к работе [1] и в определенном смысле является ее продолжением.

Для случая, когда двумерная область есть круг, теорема 1 и некоторые другие критерии существования L_2 -пределных значений на границе области для полигармонических функций установлены в работе [2]. Аналогичные результаты получены в работе [3] для случая полосы в n -мерном пространстве \mathbb{R}_n при любом $n \geq 2$ для решений линейного эллиптического уравнения с постоянными коэффициентами порядка $2m$, $m \geq 1$, характеристический многочлен которых отличается от характеристического многочлена для m -гармонического оператора на произвольный многочлен степени, меньшей чем $2m$.

Отметим, что содержащиеся в теоремах 1 и 2 условия, обеспечивающие существование L_2 -предела на границе области у m -гармонической функции, не зависят от m и относятся к любому решению уравнения (1), в том числе и к произвольной гармонической функции. С другой стороны, для гармонических функций, как известно (см. [4, 5], а для решений общих линейных эллиптических уравнений второго порядка с достаточно гладкими коэффициентами в ограниченных областях n -мерного пространства с достаточно гладкой границей см. [6]), критерием существования L_2 -предела на границе является условие их принадлежности классу Харди H_2 , т. е. в определенном смысле условие их L_2 -ограниченности вблизи границы. Это, конечно, не противоречит теореме 1, поскольку для решений эллиптических уравнений второго порядка, как показано в [6], условие их L_2 -ограниченности вблизи границы является условием их L_2 -компактности. При этом в работах [2, 3] приведены примеры, показывающие,

что условие L_2 -ограниченности вблизи границы решения уравнения порядка, большего чем 2, критерием быть не может: это условие, конечно, необходимо, но достаточным, вообще говоря, не является.

Одним из основных моментов при изучении интересующего нас вопроса для решений весьма общего линейного уравнения второго порядка является установленная в [6] априорная оценка таких решений. Для решений уравнения более высокого порядка подобной оценки получить не удалось, поэтому приходится ограничивать себя лишь отдельными классами уравнений высокого порядка и пользоваться специальными структурными свойствами их решений.

Поскольку из L_2 -компактности (или L_2 -слабой компактности) вблизи границы комплекснозначной полигармонической функции $u(z)$, очевидно, вытекает L_2 -компактность (соответственно L_2 -слабая компактность) вблизи границы вещественнозначных полигармонических функций $\operatorname{Re} u(z)$ и $\operatorname{Im} u(z)$, то сформулированные выше теоремы достаточно доказать для вещественнозначных полигармонических функций. В связи с этим в дальнейшем будем считать функцию $u(z)$ принимающей лишь вещественные значения.

Хорошо известно [7], что для любой вещественнозначной m -гармонической в области Q функции $u(z)$ существуют m аналитических в Q функций $f_0(z), f_1(z), \dots, f_{m-1}(z)$ комплексного переменного z таких, что

$$u(z) = \operatorname{Re}(f_0(z) + \bar{z}f_1(z) + \dots + \bar{z}^{m-1}f_{m-1}(z)), \quad z \in Q. \quad (6)$$

Функции $f_i(z)$, $i = 0, 1, \dots, m-1$, определяются по функции $u(z)$ неоднозначно: они определяются с точностью до слагаемых, которые являются некоторыми многочленами степени не выше чем m . Поскольку добавление к функциям $f_0(z), f_1(z), \dots, f_{m-1}(z)$ многочленов степени m не изменяет их поведения вблизи границы области в интересующем нас смысле, т. е. в смысле существования предельного значения на границе области у функции $u(z)$ или ее L_2 -компактности (или ее слабой L_2 -компактности) вблизи границы, то в дальнейшем мы ограничимся каким-либо конкретным выбором в равенстве (6) этих функций.

В результате преобразования (2) равенство (6) приобретает вид

$$U(w) = \operatorname{Re}(F_0(w) + \overline{z(w)}F_1(w) + \dots + (\overline{z(w)})^{m-1}F_{m-1}(w)), \quad |w| < 1, \quad (7)$$

где $U(w) = u(z(w))$, $|w| < 1$, — вещественнозначная функция, а $F_0(w) = f_0(z(w))$, $F_1(w) = f_1(z(w))$, \dots , $F_{m-1}(w) = f_{m-1}(z(w))$ — аналитические в круге $\{|w| < 1\}$ функции.

Согласно принятым выше определениям исследование вопроса о существовании L_2 -предела и слабого L_2 -предела функции $u(z)$ на границе области Q сводится к изучению поведения множества следов функции $U(w)$ на окружностях $\{|w| = r\}$, $r_0 < r < 1$, т. е. множества функций

$$\{U(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}, \quad r_0 < r < 1, \quad (8)$$

а доказательство сформулированных теорем эквивалентно доказательству соответствующих утверждений для функции $U(w)$, т. е. доказательству следующих теорем 1' и 2'.

Теорема 1'. Для того чтобы множество функций (8) имело $L_2(0, 2\pi)$ -предел при $r \rightarrow 1-0$, необходимо и достаточно, чтобы это множество было L_2 -компактным.

Теорема 2'. Для того чтобы множество функций (8) имело слабый $L_2(0, 2\pi)$ -предел при $r \rightarrow 1 - 0$, необходимо и достаточно, чтобы это множество было слабо $L_2(0, 2\pi)$ -компактным, т. е. $L_2(0, 2\pi)$ -ограниченным.

В силу предположения о границе ∂Q области Q функция $z(w)$, $|w| < 1$, из равенства (3) аналитически продолжается в круг $\{|w| < R\}$ некоторого радиуса $R = R(\partial Q) > 1$ и тем самым функция $\overline{z(1/\bar{w})}$ является аналитической по w для $|w| > 1/R$. Поскольку нас интересует поведение функции $U(re^{i\varphi})$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, $r < 1$, для r , достаточно близких к $r = 1$, то наряду с представлением (7) для функции $U(w)$ в круге $\{|w| < 1\}$ можно воспользоваться также другими ее представлениями, имеющими место, может быть, не во всем круге $\{|w| < 1\}$, а лишь в некоторой его подобласти, примыкающей к границе $\{|w| = 1\}$.

Для получения одного из таких представлений, справедливого в кольце $\{1/R < |w| < 1\}$, рассмотрим многочлен (по ζ)

$$P(z, \zeta) = f_0(z) + \zeta f_1(z) + \dots + \zeta^{m-1} f_{m-1}(z)$$

с аналитическими по z в области Q коэффициентами и представим его согласно формуле Тейлора в виде

$$P(z, \zeta) = P(z, a) + \frac{1}{1!} \frac{\partial P(z, \zeta)}{\partial \zeta} \Big|_{\zeta=a} (\zeta - a) + \dots + \frac{1}{(m-1)!} \frac{\partial^{m-1} P(z, \zeta)}{\partial \zeta^{m-1}} \Big|_{\zeta=a} (\zeta - a)^{m-1},$$

где a — произвольное комплексное число. Полагая в этом равенстве $z = z(w)$, $\zeta = \overline{z(1/\bar{w})}$, $a = \overline{z(1/\bar{w})}$, где $w \in \{1/R < |w| < 1\}$, получим

$$P(z(w), \overline{z(1/\bar{w})}) = G_0(w) + G_1(w)A(w) + \dots + G_{m-1}(w)(A(w))^{m-1}, \quad \frac{1}{R} < |w| < 1, \quad (9)$$

где

$$A(w) = \overline{z(w)} - \overline{z(1/\bar{w})}, \quad (10)$$

а

$$\begin{aligned} G_0(w) &= P(z(w), \overline{z(1/\bar{w})}) \\ &= f_0(z(w)) + \overline{z(1/\bar{w})} f_1(z(w)) + \dots + (\overline{z(1/\bar{w})})^{m-1} f_{m-1}(z(w)) \\ &= F_0(w) + \overline{z(1/\bar{w})} F_1(w) + \dots + (\overline{z(1/\bar{w})})^{m-1} F_{m-1}(w), \quad \frac{1}{R} < |w| < 1, \dots, \\ G_k(w) &= \frac{1}{k!} \frac{\partial^k P(z(w), \zeta)}{\partial \zeta^k} \Big|_{\zeta=\overline{z(1/\bar{w})}}, \quad k = 0, 1, \dots, m-1, \quad \frac{1}{R} < |w| < 1. \quad (11) \end{aligned}$$

Замечая, наконец, что $U(w) = \operatorname{Re} P(z(w), \overline{z(1/\bar{w})})$ при $1/R < |w| < 1$, приходим к искомому представлению функции $U(w)$ в кольце $1/R < |w| < 1$:

$$U(w) = \operatorname{Re}(G_0(w) + G_1(w)A(w) + \dots + G_{m-1}(w)(A(w))^{m-1}), \quad \frac{1}{R} < |w| < 1. \quad (12)$$

Поскольку функция $z(w)$ аналитична в круге $\{|w| < R\}$, а функция $\overline{z(1/\bar{w})}$ аналитична вне круга $\{|w| \leq 1/R\}$, то функция $A(w)$ как функция вещественных переменных $w_1 = \operatorname{Re} w$ и $w_2 = \operatorname{Im} w$ ($w = w_1 + iw_2 = re^{i\varphi}$) бесконечно дифференцируема в кольце $\{1/R < |w| < R\}$, $A(w) \in C^\infty(1/R^2 < w_1^2 + w_2^2 < R^2)$, причем

$$A(re^{i\varphi})|_{r=1} = \left(\overline{z(re^{i\varphi})} - \overline{z\left(\frac{1}{r}e^{i\varphi}\right)} \right) \Big|_{r=1} = 0, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

При любом $k = 0, 1, \dots, m - 1$ функция $G_k(w)$ является аналитической в кольце $\{1/R < |w| < 1\}$, и пусть лорановское разложение в этом кольце функции $G_k(w)$ имеет вид

$$G_k(w) = H_k(w) + \tilde{H}_k(w), \quad \frac{1}{R} < |w| < 1, \quad k = 0, 1, \dots, m - 1, \quad (13)$$

где

$$H_k(w) = \sum_{n=0}^{\infty} h_n^{(k)} w^n, \quad |w| < 1, \quad k = 0, 1, \dots, m - 1, \quad (14)$$

— правильная часть ряда Лорана функции $G_k(w)$, а

$$\tilde{H}_k(w) = \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{h}_n^{(k)} \frac{1}{w^n}, \quad |w| > \frac{1}{R}, \quad k = 0, 1, \dots, m - 1, \quad (\tilde{14})$$

— главная его часть.

Подставляя (13), (14) и ($\tilde{14}$) в (12), получаем равенство, с которым будем в дальнейшем работать:

$$U(w) = V(w) + U_0(w) + U_1(w) + \dots + U_{m-1}(w), \quad \frac{1}{R} < |w| < 1. \quad (15)$$

В этом равенстве

$$V(w) = \operatorname{Re}(\tilde{H}_0(w) + A(w)\tilde{H}_1(w) + \dots + (A(w))^{m-1}\tilde{H}_{m-1}(w)), \quad \frac{1}{R} < |w| < 1, \quad (16)$$

$$U_0(w) = \operatorname{Re}(H_0(w)), \quad \frac{1}{R} < |w| < 1, \quad (17)$$

$$U_k(w) = \operatorname{Re}((A(w))^k H_k(w)), \quad \frac{1}{R} < |w| < 1, \quad k = 1, 2, \dots, m - 1. \quad (18)$$

Из (16), ($\tilde{14}$) и (10) вытекает, что функция $V(w)$ непрерывна в $\{1/R < |w| \leq 1\}$, а из (17) и (14) (при $k = 0$) следует, что функция $U_0(w)$ как вещественная часть аналитической в круге $\{|w| < 1\}$ функции гармонична в этом круге.

С поточечным функциональным равенством (15) естественно связано равенство следов соответствующих функций: след функции U на окружности $\{|w| = r\}$ есть сумма следов на этой окружности функций V, U_0, \dots, U_{m-1} . Поэтому с являющимся предметом нашего рассмотрения при доказательстве теорем 1' и 2' множеством следов функции $U(w)$ (8), в котором положим

$$r_0 = \frac{2}{R+1}, \quad r_0 \in (1/R, 1),$$

естественно связать соответствующие множества следов функций $V(w), U_0(w), \dots, U_{m-1}(w)$:

$$\{V(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1, \quad (19)$$

$$\{U_0(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1, \quad (20)$$

.....

$$\{U_k(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1, \quad k = 1, 2, \dots, m - 1. \quad (21)$$

Пусть

$$z(w) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k w^k, \quad |w| < R, \quad (22)$$

— разложение в ряд Тейлора функции $z(w)$, осуществляющей преобразование (3). Для коэффициентов этого разложения справедливы оценки Коши: для любого ρ , $0 < \rho < R$,

$$|a_k| \leq \frac{M}{\rho^k}, \quad \text{где } M = M(\rho) = \max_{|w|=\rho} |z(w)|, \quad k \geq 0. \quad (23)$$

Аналогичные оценки имеют место и для тейлоровских коэффициентов разложений (14) функций $H_p(w)$: для любого ρ_1 , $0 < \rho_1 < 1$, и любого $p = 0, 1, \dots, m-1$

$$|h_k^{(p)}| \leq \frac{M_p}{\rho_1^k}, \quad \text{где } M_p = M_p(\rho_1) = \max_{|w|=\rho_1} |H_p(w)|, \quad k \geq 0, \quad p = 0, 1, \dots, m-1. \quad (24)$$

В дальнейшем будем считать, что

$$\rho = \frac{1+R}{2} > 1, \quad \rho_1 = \frac{3+R}{2(1+R)} < 1 \quad (25)$$

и тем самым

$$\rho_1 \rho = \frac{3+R}{4} > 1. \quad (26)$$

Подставляя разложение (22) в формулу (10), получим равенство

$$\begin{aligned} A(re^{i\varphi}) &= \sum_{k=0}^{\infty} \bar{a}_k r^k e^{-ik\varphi} - \sum_{k=0}^{\infty} \bar{a}_k r^{-k} e^{-ik\varphi} = \sum_{k=1}^{\infty} \bar{a}_k (r^k - r^{-k}) e^{-ik\varphi} \\ &= (r - r^{-1}) \sum_{k=1}^{\infty} a_k^{(1)}(r) e^{-ik\varphi}, \quad \frac{2}{R+1} < r \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \end{aligned} \quad (27)$$

в котором коэффициенты

$$a_k^{(1)}(r) = \bar{a}_k (r^{k-1} + r^{k-3} + \dots + r^{-(k-1)})$$

можно оценить с помощью неравенств (23):

$$|a_k^{(1)}(r)| \leq |a_k| (r^{k-1} + \dots + r^{-(k-1)}) \leq \frac{M}{\rho^k} \frac{k}{r^{k-1}}, \quad k \geq 1, \quad (28)$$

где $\rho = \frac{1+R}{2}$, а r — произвольное число из $(\frac{2}{R+1}, 1]$.

Для квадрата функции $A(re^{i\varphi})$ имеем

$$\begin{aligned} A^2(re^{i\varphi}) &= (r - r^{-1})^2 \sum_{k=1}^{\infty} a_k^{(1)}(r) e^{-ik\varphi} \sum_{m=1}^{\infty} a_m^{(1)}(r) e^{-im\varphi} \\ &= (r - r^{-1})^2 \sum_{n=2}^{\infty} a_n^{(2)}(r) e^{-in\varphi}, \quad \frac{2}{R+1} < r \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \end{aligned}$$

где коэффициент

$$a_n^{(2)}(r) = \sum_{k=1}^{n-1} a_k^{(1)}(r) a_{n-k}^{(1)}(r)$$

удовлетворяет в силу (28) неравенству

$$\begin{aligned} |a_n^{(2)}(r)| &\leq \sum_{k=1}^{n-1} |a_k^{(1)}(r)| |a_{n-k}^{(1)}(r)| \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{M}{\rho^k} \frac{k}{r^{k-1}} \frac{M}{\rho^{n-k}} \frac{n-k}{r^{n-k-1}} \\ &= \frac{M^2}{\rho^n r^{n-2}} \sum_{k=1}^{n-1} k(n-k) \leq \frac{M^2}{\rho^n r^{n-2}} n^3, \quad n \geq 2, \end{aligned}$$

в котором $\rho = \frac{1+R}{2}$, а r — любое число из $(\frac{2}{R+1}, 1]$.

Аналогично для любого $p \geq 1$ получим разложение

$$A^p(re^{i\varphi}) = (r - r^{-1})^p \sum_{n=p}^{\infty} a_n^{(p)}(r) e^{-in\varphi}, \quad \frac{2}{R+1} < r \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad (29)$$

коэффициенты $a_n^{(p)}(r)$ которого удовлетворяют неравенствам

$$|a_n^{(p)}(r)| \leq \frac{M^p}{\rho^n r^{n-p}} n^{2p-1}, \quad n \geq p, \quad (30)$$

где $\rho = \frac{1+R}{2}$, а r — любое число из $(\frac{2}{R+1}, 1]$.

Соотношения (29) и (30) проще всего доказать методом математической индукции: предполагая справедливость этих соотношений для некоторого $p \geq 1$, докажем, что

$$A^{p+1}(re^{i\varphi}) = (r - r^{-1})^{p+1} \sum_{n=p+1}^{\infty} a_n^{(p+1)}(r) e^{-in\varphi}, \quad \frac{2}{R+1} < r \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad (29')$$

где

$$|a_n^{(p+1)}(r)| \leq \frac{M^{p+1}}{\rho^n r^{n-p-1}} n^{2p+1} \quad (30')$$

при $\rho = \frac{1+R}{2}$ и всех $r \in (\frac{2}{R+1}, 1]$.

Действительно,

$$\begin{aligned} A^{p+1}(re^{i\varphi}) &= A(re^{i\varphi})A^p(re^{i\varphi}) = (r - r^{-1})^{p+1} \sum_{k=1}^{\infty} a_k^{(1)}(r) e^{-ik\varphi} \sum_{m=p}^{\infty} a_m^{(p)}(r) e^{-im\varphi} \\ &= (r - r^{-1})^{p+1} \sum_{n=p+1}^{\infty} e^{-in\varphi} \sum_{k=1}^{n-p} a_k^{(1)}(r) a_{n-k}^{(p)}(r), \end{aligned}$$

т. е. имеет место равенство (29'), в котором

$$a_n^{(p+1)}(r) = \sum_{k=1}^{n-p} a_k^{(1)}(r) a_{n-k}^{(p)}(r),$$

причем

$$\begin{aligned} |a_n^{(p+1)}(r)| &\leq \sum_{k=1}^{n-p} \frac{M}{\rho^k} \frac{k}{r^{k-1}} \frac{M^p}{\rho^{n-k}} \frac{(n-k)^{2p-1}}{r^{n-k-p}} \\ &\leq \frac{M^{p+1}}{\rho^n r^{n-p-1}} \sum_{k=1}^{n-p} k(n-k)^{2p-1} \leq \frac{M^{p+1}}{\rho^n r^{n-p-1}} n^{2p+1}, \end{aligned}$$

т. е. справедлива оценка (30'), что и требовалось установить.

Далее, при любом $p = 1, 2, \dots, m-1$, любых $r \in (\frac{2}{R+1}, 1)$ и $\varphi \in [0, 2\pi]$ в силу (14) и (29)

$$\begin{aligned} H_p(re^{i\varphi})A^p(re^{i\varphi}) &= (r - r^{-1})^p \sum_{k=0}^{\infty} h_k^{(p)} r^k e^{ik\varphi} \sum_{n=p}^{\infty} a_n^{(p)}(r) e^{-in\varphi} \\ &= (r - r^{-1})^p \sum_{n=-p}^{\infty} g_n^{(p)}(r) e^{in\varphi}, \end{aligned} \quad (31)$$

где для всех $p = 1, \dots, m-1$, $n \geq -p$, всех $r \in (\frac{2}{R+1}, 1)$ и $\varphi \in [0, 2\pi]$

$$g_n^{(p)}(r) = \sum_{k=0}^{\infty} h_{p+k+n}^{(p)} r^{p+k+n} a_{p+k}^{(p)}(r). \quad (32)$$

Коэффициенты $g_n^{(p)}(r)$ разложения (31) в силу соотношений (24) и (30) удовлетворяют при всех $p = 1, 2, \dots, m-1$, $n \geq -p$, $r \in (\frac{2}{R+1}, 1)$ неравенствам

$$|g_n^{(p)}(r)| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{M_p r^{p+k+n}}{\rho_1^{p+k+n}} \frac{M^p (p+k)^{2p-1}}{\rho^{p+k} r^{p+k-p}} = \frac{M_p M^p r^{p+n}}{\rho_1^{p+n} \rho^p} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(p+k)^{2p-1}}{\rho_1^k \rho^k},$$

в которых ρ и ρ_1 определены в (25) и, следовательно, в силу (26) ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(p+k)^{2p-1}}{\rho_1^k \rho^k}$$

сходится при любом $p = 1, \dots, m-1$. Таким образом, при любом $p = 1, \dots, m-1$ и любом $n \geq -p$ существует постоянная $C_n(p, R) > 0$ такая, что для всех $r \in (\frac{2}{R+1}, 1)$

$$|g_n^{(p)}(r)| \leq C_n(p, R), \quad p = 1, \dots, m-1, \quad n \geq -p, \quad r \in \left(\frac{2}{R+1}, 1\right). \quad (33)$$

Из (14) при $k=0$ и (17) вытекает, что

$$U_0(re^{i\varphi}) = \operatorname{Re} \sum_{n=0}^{\infty} h_n^{(0)} r^n e^{in\varphi} = \sum_{n=0}^{\infty} (h_n^{(0)' } \cos n\varphi - h_n^{(0)'' } \sin n\varphi) r^n, \quad (34)$$

где $h_n^{(0)' } = \operatorname{Re} h_n^{(0)}$, $h_n^{(0)'' } = \operatorname{Im} h_n^{(0)}$, $n = 0, 1, \dots$

Аналогично из (18) и (31) для всех $1 \leq p \leq m-1$ имеем

$$\begin{aligned} U_p(re^{i\varphi}) &= (r - r^{-1})^p \operatorname{Re} \sum_{n=-p}^{\infty} g_n^{(p)}(r) e^{in\varphi} \\ &= (r - r^{-1})^p \sum_{n=-p}^{\infty} (g_n^{(p)' } (r) \cos n\varphi - g_n^{(p)'' } (r) \sin n\varphi), \end{aligned}$$

где $g_n^{(p)' } (r) = \operatorname{Re} g_n^{(p)}$, $g_n^{(p)'' } (r) = \operatorname{Im} g_n^{(p)}$, $n = -p, -p+1, \dots$. Следовательно,

$$U_p(re^{i\varphi}) = (r - r^{-1})^p \left[\sum_{n=-p}^{-1} (g_n^{(p)' } (r) \cos n\varphi - g_n^{(p)'' } (r) \sin n\varphi) \right]$$

$$\begin{aligned}
 & + \sum_{n=0}^{\infty} (g_n^{(p)'}(r) \cos n\varphi - g_n^{(p)''}(r) \sin n\varphi) \Big] \\
 = & (r - r^{-1})^p \left[\sum_{n=1}^p (g_{-n}^{(p)'}(r) \cos n\varphi + g_{-n}^{(p)''}(r) \sin n\varphi) \right. \\
 & \left. + \sum_{n=0}^{\infty} (g_n^{(p)'}(r) \cos n\varphi - g_n^{(p)''}(r) \sin n\varphi) \right] \\
 = & (r - r^{-1})^p \left[g_0^{(p)'} + \sum_{n=1}^p (g_n^{(p)'}(r) + g_{-n}^{(p)'}(r)) \cos n\varphi \right. \\
 & \left. + \sum_{n=1}^p (g_{-n}^{(p)''}(r) - g_n^{(p)''}(r)) \sin n\varphi + \sum_{n=p+1}^{\infty} (g_n^{(p)'}(r) \cos n\varphi - g_n^{(p)''}(r) \sin n\varphi) \right]. \quad (35)
 \end{aligned}$$

Для доказательства сформулированных теорем нам понадобятся несколько вспомогательных утверждений.

Лемма 1. Семейство функций (8) ($r_0 = \frac{2}{R+1}$) $L_2(0, 2\pi)$ -ограничено (слабо $L_2(0, 2\pi)$ -компактно) тогда и только тогда, когда $L_2(0, 2\pi)$ -ограничены (слабо $L_2(0, 2\pi)$ -компактны) семейство функций $\{U_0(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$, $\frac{2}{R+1} < r < 1$ (20), и семейство функций $\left\{ \sum_{k=1}^{m-1} U_k(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}$, $\frac{2}{R+1} < r < 1$ (21).

Напомним, что семейство функций $\{V(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$, $\frac{2}{R+1} < r < 1$ (19), $L_2(0, 2\pi)$ -ограничено, поскольку $V(w) \in C(\frac{2}{R+1} \leq |w| \leq 1) \subset C(1/R < |w| \leq 1)$, поэтому в доказательстве нуждается лишь утверждение леммы о необходимости.

Пусть

$$A = \sup_{\frac{2}{R+1} < r < 1} \|U(re^{i\varphi})\|_{L_2(0,2\pi)} < \infty, \quad A_1 = \sup_{\frac{2}{R+1} < r < 1} \|V(re^{i\varphi})\|_{L_2(0,2\pi)}.$$

Тогда в силу (15)

$$\left\| U_0(re^{i\varphi}) + \sum_{k=1}^{m-1} U_k(re^{i\varphi}) \right\|_{L_2(0,2\pi)}^2 \leq 2(A^2 + A_1^2), \quad \frac{2}{R+1} < r < 1,$$

и тем самым согласно (34) и (35) для всех $r \in (\frac{2}{R+1}, 1)$

$$\begin{aligned}
 \frac{2(A^2 + A_1^2)}{\pi} & \geq 2 \left(h_0^{(0)'} + \sum_{p=1}^{m-1} (r - r^{-1})^p g_0^{(p)'}(r) \right)^2 \\
 & + \sum_{n=1}^{m-1} \left(h_n^{(0)'} r^n + \sum_{p=n}^{m-1} (r - r^{-1})^p (g_n^{(p)'}(r) + g_{-n}^{(p)'}(r)) + \sum_{p=1}^{n-1} (r - r^{-1})^p g_n^{(p)'}(r) \right)^2 \\
 & + \sum_{n=1}^{m-1} \left(-h_n^{(0)''} r^n + \sum_{p=n}^{m-1} (r - r^{-1})^p (g_n^{(p)''}(r) - g_{-n}^{(p)''}(r)) - \sum_{p=1}^{n-1} (r - r^{-1})^p g_n^{(p)''}(r) \right)^2 \\
 & + \sum_{n=m}^{\infty} \left(h_n^{(0)'} r^n + \sum_{p=1}^{m-1} (r - r^{-1})^p g_n^{(p)'}(r) \right)^2
 \end{aligned}$$

$$+ \sum_{n=m}^{\infty} \left(h_n^{(0)''} r^n + \sum_{p=1}^{m-1} (r - r^{-1})^p g_n^{(p)''}(r) \right)^2.$$

Следовательно, при любом $N \geq m$ и при всех $r \in (\frac{2}{R+1}, 1)$

$$\begin{aligned} \frac{2(A^2 + A_1^2)}{\pi} &\geq 2 \left(h_0^{(0)'} + \sum_{p=1}^{m-1} (r - r^{-1})^p g_0^{(p)'}(r) \right)^2 \\ &+ \sum_{n=1}^{m-1} \left(h_n^{(0)'} r^n + \sum_{p=n}^{m-1} (r - r^{-1})^p (g_n^{(p)'}(r) + g_{-n}^{(p)'}(r)) + \sum_{p=1}^{n-1} (r - r^{-1})^p g_n^{(p)'}(r) \right)^2 \\ &+ \sum_{n=1}^{m-1} \left(-h_n^{(0)''} r^n + \sum_{p=n}^{m-1} (r - r^{-1})^p (g_{-n}^{(p)''}(r) - g_n^{(p)''}(r)) - \sum_{p=1}^{n-1} (r - r^{-1})^p g_n^{(p)''}(r) \right)^2 \\ &+ \sum_{n=m}^N \left(h_n^{(0)'} r^n + \sum_{p=1}^{m-1} (r - r^{-1})^p g_n^{(p)'}(r) \right)^2 \\ &+ \sum_{n=m}^N \left(h_n^{(0)''} r^n + \sum_{p=1}^{m-1} (r - r^{-1})^p g_n^{(p)''}(r) \right)^2. \end{aligned} \tag{36}$$

В силу неравенств (33) для любого $N \geq 1$ существует постоянная

$$C(N) = \max_{1 \leq p \leq m-1} \max_{-p \leq n \leq N} C_n(p, R)$$

такая, что для всех $p = 1, \dots, m - 1, n \in [-p, N], r \in (\frac{2}{R+1}, 1)$ будет

$$|g_n^{(p)}(r)| \leq C(N),$$

и тем самым имеют место неравенства

$$|g_n^{(p)'}(r)| \leq C(N), \quad |g_n^{(p)''}(r)| \leq C(N),$$

$$p = 1, \dots, m - 1, \quad n = -p, -p + 1, \dots, N, \quad r \in (2/(R + 1), 1).$$

Следовательно, в (36) можно перейти к пределу при $r \rightarrow 1 - 0$. В результате получим справедливое при всех $N \geq m$ неравенство

$$\frac{2(A^2 + A_1^2)}{\pi} \geq 2(h_0^{(0)})^2 + \sum_{n=1}^N ((h_n^{(0)'})^2 + (h_n^{(0)''})^2),$$

из которого вытекает сходимость ряда

$$2(h_0^{(0)})^2 + \sum_{n=1}^{\infty} ((h_n^{(0)'})^2 + (h_n^{(0)''})^2),$$

т. е. в силу (34) семейство функций $\{U_0(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}, \frac{2}{R+1} < r < 1,$ $L_2(0, 2\pi)$ -ограничено. Поскольку семейства функций $\{U(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}, \frac{2}{R+1} < r < 1,$ и $\{V(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}, \frac{2}{R+1} < r < 1,$ являются $L_2(0, 2\pi)$ -ограниченными, то $L_2(0, 2\pi)$ -ограничено и семейство

$$\left\{ \sum_{p=1}^{m-1} U_p(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1.$$

Лемма 1 доказана.

Лемма 2. Семейство функций (8) ($r_0 = \frac{2}{R+1}$) $L_2(0, 2\pi)$ -компактно тогда и только тогда, когда $L_2(0, 2\pi)$ -компактны семейства функций

$$\{U_0(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1,$$

и

$$\left\{ \sum_{p=1}^{m-1} U_p(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1.$$

Поскольку семейство функций $\{V(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$, $\frac{2}{R+1} < r < 1$, очевидно, $L_2(0, 2\pi)$ -компактно, в доказательстве и этой леммы нуждается лишь утверждение о необходимости.

Из $L_2(0, 2\pi)$ -компактности семейства (8) следует его $L_2(0, 2\pi)$ -ограниченность и, следовательно, по лемме 1 $L_2(0, 2\pi)$ -ограниченность семейства $\{U_0(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$, $\frac{2}{R+1} < r < 1$, являющегося семейством следов гармонической функции. Но тогда, как хорошо известно (см., например, [4–6]), это последнее семейство функций $L_2(0, 2\pi)$ -компактно (и даже имеет $L_2(0, 2\pi)$ -предел при $r \rightarrow 1 - 0$). Поэтому $L_2(0, 2\pi)$ -компактно и семейство функций

$$\left\{ \sum_{p=1}^{m-1} U_p(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1.$$

Лемма 2 доказана.

Лемма 3. Если семейство функций

$$\left\{ \sum_{p=1}^{m-1} U_p(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1, \quad (37)$$

$L_2(0, 2\pi)$ -ограничено (слабо $L_2(0, 2\pi)$ -компактно), то при $r \rightarrow 1 - 0$ существует его слабый $L_2(0, 2\pi)$ -предел, и этот предел равен нулю.

Поскольку исследуемое в этой лемме семейство функций (37) $L_2(0, 2\pi)$ -ограничено, то для доказательства утверждения леммы достаточно проверить, что все коэффициенты Фурье по тригонометрической системе, линейная оболочка которой всюду плотна в $L_2(0, 2\pi)$, каждой функции $U_p(re^{i\varphi})$, $p = 1, \dots, m-1$, стремятся при $r \rightarrow 1 - 0$ к нулю. Для проверки этого факта следует воспользоваться равенством (35). Из него вытекает, что кос-коэффициенты Фурье функций $U_p(re^{i\varphi})$, $p = 1, \dots, m-1$, имеют вид

$$I_{n,p}(r) = (U_p(re^{i\varphi}), \cos n\varphi)_{L_2(0,2\pi)} = \pi(g_n^{(p)'}(r) + g_{-n}^{(p)'}(r))(r - r^{-1})^p,$$

если $n \leq p$, и

$$I_{n,p}(r) = (U_p(re^{i\varphi}), \cos n\varphi)_{L_2(0,2\pi)} = \pi g_n^{(p)'}(r)(r - r^{-1})^p,$$

если $n > p$; син-коэффициенты Фурье функций $U_p(re^{i\varphi})$, $p = 1, \dots, m-1$, имеют вид

$$J_{n,p}(r) = (U_p(re^{i\varphi}), \sin n\varphi)_{L_2(0,2\pi)} = \pi(g_{-n}^{(p)''}(r) - g_n^{(p)''}(r))(r - r^{-1})^p,$$

если $n \leq p$, и

$$J_{n,p}(r) = (U_p(re^{i\varphi}), \sin n\varphi)_{L_2(0,2\pi)} = -\pi g_n^{(p)''}(r)(r - r^{-1})^p,$$

если $n > p$; а нулевой коэффициент Фурье функций $U_p(re^{i\varphi})$, $p = 1, \dots, m-1$, имеет вид

$$I_{0,p}(r) = (U_p(re^{i\varphi}), 1)_{L_2(0,2\pi)} = 2\pi g_0^{(p)'}(r)(r - r^{-1})^p.$$

Если теперь воспользоваться неравенствами (34) для функций $g_n^{(p)'}(r)$ и $g_n^{(p)''}(r)$, $p = 1, \dots, m-1$, $n \geq -p$, $r \in (\frac{2}{R+1}, 1)$, и перейти в полученных для функций $I_{n,p}(r)$, $n \geq 0$, $p = 1, \dots, m-1$, и функций $J_{n,p}(r)$, $n \geq 1, \dots, m-1$, равенствах к пределу при $r \rightarrow 1-0$ при произвольно фиксированных n и p , то получим доказательство требуемого утверждения. Лемма 3 доказана.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2'. В доказательстве, естественно, нуждается лишь утверждение о достаточности. Если множество функций $\{U(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$, $\frac{2}{R+1} < r < 1$, слабо $L_2(0, 2\pi)$ -компактно, то по лемме 1 множества функций

$$\{U_0(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1,$$

и

$$\left\{ \sum_{p=1}^{m-1} U_p(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1,$$

$L_2(0, 2\pi)$ -ограничены. По лемме 3 множество

$$\left\{ \sum_{p=1}^{m-1} U_p(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1,$$

при $r \rightarrow 1-0$ слабо в $L_2(0, 2\pi)$ стремится к нулю. А $L_2(0, 2\pi)$ -ограниченное множество $\{U_0(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$, $\frac{2}{R+1} < r < 1$, следов гармонической функции имеет, как выше отмечалось, даже $L_2(0, 2\pi)$ -предел при $r \rightarrow 1-0$, который в сумме с граничным значением $V(re^{i\varphi})|_{r=1}$ и является слабым $L_2(0, 2\pi)$ -пределом множества $\{U(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$, $\frac{2}{R+1} < r < 1$, при $r \rightarrow 1-0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1'. При доказательстве этой теоремы также следует остановиться лишь на проверке утверждения о достаточности. Так как семейство функций $\{U(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$, $\frac{2}{R+1} < r < 1$, является $L_2(0, 2\pi)$ -компактным, по лемме 2 $L_2(0, 2\pi)$ -компактны также семейства функций

$$\{U_0(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1,$$

и

$$\left\{ \sum_{p=1}^{m-1} U_p(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1.$$

Как уже неоднократно отмечалось, первое семейство имеет $L_2(0, 2\pi)$ -предел при $r \rightarrow 1-0$. Нам остается показать, что $L_2(0, 2\pi)$ -предел при $r \rightarrow 1-0$ имеется и у второго семейства (причем нулевой $L_2(0, 2\pi)$ -предел). Действительно, это семейство $L_2(0, 2\pi)$ -ограничено, поэтому по лемме 3 оно, и тем более любое его подсемейство при $r \rightarrow 1-0$, слабо в $L_2(0, 2\pi)$ сходится к нулю.

Пусть семейство

$$\left\{ \sum_{p=1}^{m-1} U_p(re^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1,$$

не сходится при $r \rightarrow 1 - 0$ к нулю в $L_2(0, 2\pi)$. Тогда существуют такое $\varepsilon_0 > 0$ и такая последовательность $r_1, r_2, \dots, r_n, \dots$, $\frac{2}{R+1} < r_n < 1$, $r_n \rightarrow 1 - 0$ при $n \rightarrow \infty$, что

$$\left\| \sum_{p=1}^{m-1} U_p(r_n e^{i\varphi}) \right\|_{L_2(0, 2\pi)} \geq \varepsilon_0 \quad \text{для всех } n \geq 1. \quad (38)$$

В силу $L_2(0, 2\pi)$ -компактности семейства функций

$$\left\{ \sum_{p=1}^{m-1} U_p(r e^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}, \quad \frac{2}{R+1} < r < 1,$$

в последовательности

$$\left\{ \sum_{p=1}^{m-1} U_p(r_n e^{i\varphi}), 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

существует сходящаяся в $L_2(0, 2\pi)$ подпоследовательность, которая может сходиться только к нулю, поскольку она сходится к нулю слабо в $L_2(0, 2\pi)$. Но тогда для элементов этой подпоследовательности будет нарушаться неравенство (38). Теорема доказана.

ЛИТЕРАТУРА

1. Михайлов В. П. О существовании граничного значения у бигармонической функции // *Мат. сб.* 2004. Т. 195, № 12. С. 81–94.
2. Михайлов В. П. О существовании предельных значений решений полигармонического уравнения на границе области // *Мат. сб.* 1996. Т. 187, № 11. С. 89–114.
3. Михайлов В. П. Существование граничного значения у метагармонических функций // *Мат. сб.* 1999. Т. 190, № 10. С. 17–48.
4. Riesz F. Über die Randwerte eines Analytische Funktion // *Math. Z.* 1923. Bd 18. S. 87–95.
5. Привалов И. И. Граничные свойства однозначных аналитических функций. М.: ГИТТЛ, 1950.
6. Михайлов В. П. О граничных значениях решений эллиптических уравнений в областях с гладкой границей // *Мат. сб.* 1976. Т. 101, № 2. С. 163–188.
7. Векуа И. Н. Новые методы решения эллиптических уравнений. М.; Л.: ГИТТЛ, 1948.

Статья поступила 25 февраля 2005 г.

*Михайлов Валентин Петрович
Математический институт им. В. А. Стеклова РАН,
ул. Губкина, 8, Москва 119991
vpnih@mi.ras.ru*