

ЧАСТНЫЕ ИНДЕКСЫ УНИТАРНОЙ И ЭРМИТОВОЙ МАТРИЦ-ФУНКЦИЙ

А. Ф. Воронин

Аннотация. Показано, что все частные индексы четной унитарной матрицы-функции порядка $n > 1$ равны нулю. Найдены новые эффективные достаточные условия для существования канонической факторизации эрмитовой матрицы-функции порядка два (когда все ее частные индексы равны нулю).

Ключевые слова: факторизация, матрица-функция, частный индекс.

Введение. Будем использовать следующие обозначения [1]: $L_{n \times n}$ — пространство $n \times n$ матриц-функций с элементами из $L_1(R)$, где R — расширенная вещественная прямая $R = (-\infty, \infty) \cup \{\pm\infty\}$; \hat{f} — Фурье-образ матрицы-функции $f \in L_{n \times n}$:

$$\hat{f}(p) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{ipt} dt, \quad p \in R;$$

$W^{n \times n}$ — алгебра Винера непрерывных матриц-функций вида $c + \hat{f}$, где c — постоянная матрица порядка n и $f \in L_{n \times n}$; $W_+^{n \times n}$ ($W_-^{n \times n}$) — подалгебра в $W^{n \times n}$, состоящая из матриц-функций вида $c + \hat{f}$ таких, что $f(t) = 0$ при $t < 0$ (при $t > 0$).

Если A — некоторая алгебра, то через $\mathcal{G}A$ обозначим группу из обратимых элементов в A .

Матрица $G \in \mathcal{G}W^{n \times n}$ допускает стандартную факторизацию, если она представляется в виде следующего произведения матриц:

$$G(x) = G_+(x)D(x)G_-(x), \quad x \in R, \quad (0.1)$$

где $G_{\pm} \in \mathcal{G}W_{\pm}^{n \times n}$, $D(x)$ — диагональная матрица-функция:

$$D(x) = \left\{ \left(\frac{x-i}{x+i} \right)^{\kappa_1}, \dots, \left(\frac{x-i}{x+i} \right)^{\kappa_n} \right\},$$

$\kappa_1 \geq \kappa_2 \geq \dots \geq \kappa_n$ — частные индексы матрицы G (целые числа), $\kappa := \text{Ind det } G(t) = \sum_{j=1}^n \kappa_j$ — суммарный индекс матрицы G . Если $\kappa_1 = \kappa_2 = \dots = \kappa_n = 0$ ($D = I$ — единичная матрица), то $G = G_+G_-$ — каноническая факторизация матрицы-функции G .

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Интеграционного проекта СО РАН (№ 2009–93) и Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 10–01–00384).

Одной из первостепенных задач теории факторизации матриц-функций и непосредственно связанных с ней теорий систем уравнений Винера — Хопфа, характеристических систем сингулярных интегральных уравнений с ядром Коши, является задача определения частных индексов матриц-функций [2, § 132–134; 3, § 5.1; 4, § 17; 5, § 5.3].

Кроме того, теория факторизации матриц-функций играет важную роль в методе обратной задачи рассеяния [6, 7] и некоторых разделах теории вероятностей [8].

К настоящему времени неизвестны методы вычисления частных индексов матриц-функций общего вида. Однако для некоторых классов матриц-функций они вычисляются. Известно, что частные индексы вычисляются для треугольных и рациональных матриц-функций (теория факторизации этих матриц-функций хорошо изучена), а также для эрмитовых положительно определенных матриц-функций, последние имеют все нулевые частные индексы [9; 10, § 8].

В [11–13] приведены критерии канонической факторизации эрмитовой матрицы-функции второго порядка (в общем случае), унитарной и круговой матрицы-функции соответственно. Отметим, что приведенные в [11–13] критерии не эффективны. Проверка условий этих критериев также является проблемой.

В данной работе в теореме 2 показано, в частности, что все частные индексы четной унитарной матрицы-функции порядка $n > 1$ равны нулю. В теореме 3 найдены эффективные достаточные условия существования канонической факторизации эрмитовой матрицы-функции порядка $n = 2$. Эти условия дополняют достаточные условия существования канонической факторизации эрмитовой матрицы-функции в [9; 10, теорема 8.1; 14]. Кроме того, в работе предложены два критерия существования канонической факторизации. Критерии эффективны по крайней мере для положительно определенных матриц-функций и четных унитарных матриц-функций. Для матриц-функций общего вида критерии имеют лишь теоретическое значение.

Перейдем к формулировкам двух непосредственно используемых в работе хорошо известных утверждений (см. [10, теоремы 7.2, 7.3]).

Теорема 1. Пусть

$$G \in \mathcal{G}W^{n \times n}. \tag{0.2}$$

Тогда матрица-функция G допускает стандартную факторизацию (0.1).

Лемма 1. Пусть выполнено условие (0.2) и суммарный индекс матрицы G равен нулю ($\kappa = 0$). Тогда любая другая стандартная факторизация матрицы $G(x)$ имеет следующий вид:

$$G(x) = \tilde{G}_+(x)D(x)\tilde{G}_-(x), \quad x \in R, \tag{0.3}$$

где

$$\tilde{G}_\pm \in \mathcal{G}W_\pm^{n \times n}, \quad \tilde{G}_+(x) = G_+(x)\Omega_+(x), \quad \tilde{G}_-(x) = \Omega_-(x)G_-(x). \tag{0.4}$$

При этом если все частные индексы равны нулю, то $\Omega := \Omega_- = \Omega_+^{-1}$ — произвольная невырожденная постоянная матрица.

В противном случае (когда не все частные индексы равны нулю) Ω_\pm — рациональные матрицы-функции из $\mathcal{G}W_\pm^{n \times n}$ соответственно и выполняются следующие соотношения:

- 1) $\omega_{jk}^+(x) \equiv 0$ при $\kappa_k > \kappa_j$;
- 2) $\omega_{jk}^+(x) = \text{const}_j$ при $\kappa_k = \kappa_j$;

3) $\omega_{jk}^+(x)$ — произвольный полином от $(x-i)/(x+i)$ степени $\leq \kappa_j - \kappa_k$ при $\kappa_k < \kappa_j$.

Здесь $\omega_{jk}^+(x)$ ($j, k = 1, \dots, n$) — элементы матрицы $\Omega_+(x)$,

$$\Omega_-(x) = D^{-1}(x)\Omega_+^{-1}(x)D(x), \quad x \in R. \quad (0.5)$$

Из леммы 1 следует, что матрица $\Omega_+(x)$ при условии, что не все частные индексы матрицы $G(x)$ равны нулю, имеет следующий общий вид:

$$\Omega_+(x) = \begin{pmatrix} Q_1 & * & \dots & * \\ 0 & Q_2 & \dots & * \\ 0 & \dots & Q_j & * \\ 0 & 0 & \dots & Q_m \end{pmatrix}, \quad (0.6)$$

где Q_j — произвольная невырожденная постоянная квадратная матрица, порядок которой m_j равен кратности индекса κ_j ($j = 1, \dots, m \leq n$). Звездочками помечены места, на которых находятся матрицы с элементами, являющимися произвольными многочленами от $(x-i)/(x+i)$ соответствующих степеней.

Очевидно, что матрицы $\Omega_{\pm}(x)$ верхние треугольные при $\kappa_k \neq \kappa_j$, $j \neq k$ ($j, k = 1, \dots, n$). В частности, для $n = 2$ матрица $\Omega_+(x)$ имеет следующий общий вид:

$$\Omega_+(x) = \begin{pmatrix} c_1 & P(x) \\ 0 & c_2 \end{pmatrix},$$

где c_1, c_2 — произвольные постоянные ($c_1 c_2 \neq 0$), $P(x)$ — произвольный полином от $(x-i)/(x+i)$ степени не выше $\kappa_1 - \kappa_2$.

Пусть матрица-функция G удовлетворяет условиям леммы 1 и среди ее частных индексов существует хотя бы один отличный от нуля. Тогда для такой матрицы $G(x)$ будем обозначать через \mathcal{K}_n множество (набор) ее частных индексов. Таким образом, $\mathcal{K}_n = \{\kappa_1, \kappa_2, \dots, \kappa_n\}$, где $\kappa_1 \geq \kappa_2 \geq \dots \geq \kappa_n$. Через $\mathcal{P}^+(R; \mathcal{K}_n)$ обозначим класс рациональных матриц-функций вида (0.6), отвечающих набору \mathcal{K}_n . Положим

$$\mathcal{P}^+(\mathcal{K}_n) := \{\Omega_+(\infty) : \Omega_+ \in \mathcal{P}^+(R; \mathcal{K}_n)\}.$$

Каждому набору \mathcal{K}_n соответствует класс постоянных матриц $\mathcal{P}^+(\mathcal{K}_n)$. Из (0.6) вытекает, что $I, V \in \mathcal{P}^+(\mathcal{K}_n)$, $I_1 \notin \mathcal{P}^+(\mathcal{K}_n)$ для любого набора \mathcal{K}_n , где V — верхняя треугольная постоянная неособенная матрица порядка n , I_1 — матрица порядка n , состоящая из нулей, за исключением неглавной диагонали, которую заполняют единицы.

Легко видеть, что матрица I_1 обладает следующими свойствами:

$$I = I_1^2, \quad I_1^{-1} = I_1^T = I_1,$$

где T — знак транспонирования.

Отметим важное свойство класса $\mathcal{P}^+(\mathcal{K}_n)$. Из (0.6) можно видеть, что $\omega_{n1}^+ = 0$, где $(\omega_{kj}^+) \equiv \Omega_+(\infty) \in \mathcal{P}^+(\mathcal{K}_n)$. Тогда, положив $(b_{kj}) := \Omega_+(\infty)I_1$, имеем

$$b_{nn} = 0 \quad (\omega_{n1}^+ = 0) \quad (0.7)$$

для любого набора \mathcal{K}_n .

Приведем достаточно элементарный критерий канонической факторизации матрицы-функции общего вида, который вытекает из леммы 1. Кроме того, что критерий имеет самостоятельное значение, идея его доказательства лежит в основе доказательств основных результатов данной работы.

Критерий 1. Пусть выполнено условие (0.2) и суммарный индекс матрицы $G(x)$ равен нулю ($\kappa = 0$). Положим

$$(\omega_{kj}^+) := G_+^{-1}(\infty)\tilde{G}_+(\infty), \tag{0.8}$$

где \tilde{G}_+ и G_+ — факторы в факторизациях (0.3) и (0.1) соответственно. Тогда если $\omega_{n1}^+ \neq 0$, то факторизация (0.1) каноническая ($D = I$).

Верно и обратное утверждение. Если матрица $G(x)$ допускает каноническую факторизацию (0.1) ($D = I$), то существует другая каноническая факторизация (0.3) ($D = I$) такая, что $\omega_{n1}^+ \neq 0$ в (0.8).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\omega_{n1}^+ \neq 0$. Предположим противное: матрица-функция G не допускает канонической факторизации. Из (0.8) и первого равенства в (0.4) получим $(\omega_{kj}^+) \in \mathcal{P}^+(\mathcal{K}_n)$. Тогда из (0.7) следует противоречивая цепочка $0 \neq \omega_{n1}^+ = 0$. Значит, принятое предположение, что $D \neq I$, неверно.

Вторая часть критерия (обратное утверждение) непосредственно вытекает из первой части леммы 1.

Из критерия 1 легко видеть, что для его практического использования достаточно показать, что $\omega_{n1}^+ \neq 0$. Но мы не имеем априорной информации о матрицах $G_+(\infty)$, $\tilde{G}_+(\infty)$ в общем случае. Однако об их произведении, матрице (ω_{kj}^+) , априорную информацию можно получить, если исходная матрица-функция $G(x)$ обладает определенной симметрией. Например, если $G(x)$ — четная унитарная или эрмитова положительно определенная матрица, то в этих случаях устанавливается, что $\omega_{n1}^+ \neq 0$.

1. Основные результаты. В данном пункте сформулируем основные результаты работы. Доказательства результатов (критерия 2 и теорем 2, 3) будут представлены в пп. 2–4 настоящей работы.

Критерий 2. Если выполнено условие (0.2) и $G(\infty) = I$, то матрица-функция G допускает каноническую факторизацию тогда и только тогда, когда существуют матрицы-функции A_{\pm} такие, что

$$A_{\pm} \in \mathcal{G}W_{\pm}^{n \times n}, \quad A_{\pm}(\infty) = I,$$

и справедливо одно из следующих двух равенств:

- (i) $G(x) = A_+(x)G^*(x)A_-(x), \quad x \in R, \quad G^* \equiv \overline{G}^T,$
- либо
- (ii) $G(x) = A_+(x)\overline{G}^{\perp}(-x)A_-(x), \quad x \in R, \quad G^{\perp} \equiv (G^T)^{-1}.$

Легко видеть, что если $A_{\pm} = I$, то критерий 2(i) следует из [9]. Из критерия 2(ii), что важно для его практической ценности, вытекает

Теорема 2. Пусть выполнено условие (0.2). Если

$$G(x) = \overline{G}^{\perp}(-x), \quad x \in R, \tag{1.1}$$

то матрица $G(x)$ допускает каноническую факторизацию ($D = I$).

Отметим, что для четной унитарной матрицы условие (1.1) выполняется. Теорема 2 анонсирована в [15].

Следствие. Пусть выполнено условие (0.2) и матрица-функция G круговая, $G(x)\overline{G}(x) = I$, $x \in R$. Если, кроме того, $G(x) = G^T(-x)$, $x \in R$, то матрица-функция G допускает каноническую факторизацию.

Легко видеть, что эрмитова матрица-функция из класса $\mathcal{G}W^{2 \times 2}$ имеет следующий общий вид:

$$G(x) = \begin{pmatrix} g_{11}(x) & g_{12}(x) \\ \overline{g_{12}(x)} & g_{22}(x) \end{pmatrix}, \quad (1.2)$$

где

$$g_{kj} \in W^{1 \times 1}, \quad \text{Im } g_{jj}(x) = 0, \quad k, j = 1, 2, \quad \det G(x) \neq 0, \quad x \in R. \quad (1.3)$$

Для вычисления частных индексов матрицы (1.2) представляет интерес лишь случай $\det G(x) < 0$, $x \in R$, так как при $\det G(x) > 0$ частные индексы матрицы (1.2) равны нулю [9]. Имеет место

Теорема 3. Пусть для матрицы $G(x)$ в (1.2) выполнено условие (1.3) и $g_{11} = -g_{22}$. Тогда если функции g_{11} и g_{12} четные, т. е. $g_{11}(x) = g_{11}(-x)$, $g_{12}(x) = g_{12}(-x)$, то все частные индексы матрицы-функции G равны нулю.

2. Доказательство критерия 2. Из условия (i) либо (ii) следует, что суммарный индекс матрицы $G(x)$ равен нулю.

Начнем с доказательства достаточности условия (i). Предположим, что матрица-функция G не допускает канонической факторизации. Тогда из условия (i) и факторизации (0.1) получим

$$G_+(x)D(x)G_-(x) = A_+(x)\overline{G}_-^T(x)\overline{D}(x)\overline{G}_+^T(x)A_-(x), \quad x \in R. \quad (2.1)$$

Положим

$$D_1(x) := I_1\overline{D}(x)I_1.$$

Непосредственно убеждаемся, что

$$D_1(x) = \left\{ \left(\frac{x-i}{x+i} \right)^{-\kappa_n}, \dots, \left(\frac{x-i}{x+i} \right)^{-\kappa_1} \right\}, \quad -\kappa_n \geq \dots \geq -\kappa_1. \quad (2.2)$$

Из (2.1), (2.2) и очевидного равенства $I_1^{-1} = I_1$ получим

$$G_+(x)D(x)G_-(x) = A_+(x)\overline{G}_-^T(x)I_1D_1(x)I_1\overline{G}_+^T(x)A_-(x), \quad x \in R. \quad (2.3)$$

Можно видеть, что левая и правая части равенства (2.3) являются стандартными факторизациями матрицы $G(x)$. Тогда из (2.3) по теореме единственности для частных индексов [5, теорема 5.4; 10, теорема 7.1] имеем $D_1 = D$, а по лемме 1 (первое равенство в (0.4)) из (2.3) следует, что

$$G_+(x)\Omega_+(x) = A_+(x)\overline{G}_-^T(x)I_1, \quad x \in R \quad (2.4)$$

где $\Omega_+(x)$ — некоторая матрица из $\mathcal{P}^+(R; \mathcal{K}_n)$. Рассмотрев равенство (2.4) в точке $x = \infty$, после элементарных преобразований получим

$$(a_{kj}) := G_-(\infty)\overline{G}_-^T(\infty) = \Omega_+(\infty)I_1 := (b_{kj}) \quad (2.5)$$

ввиду того, что

$$A_+(\infty) = I, \quad G_+(\infty)G_-(\infty) = I \quad (2.6)$$

по условию. Из (2.5), (0.7) и условия невырожденности матрицы $G_-(\infty)$ следует невозможная цепочка соотношений:

$$0 \neq \sum_{j=1}^n |g_{nj}^-(\infty)|^2 = a_{nn} = b_{nn} = 0,$$

где g_{kj}^- ($k, j = 1, \dots, n$) — элементы матрицы-функции G_- . Следовательно, предположение, что матрица-функция G не допускает канонической факторизации неверно ввиду полученного противоречия.

Доказательство достаточности условия (ii) проведем по аналогии с доказательством достаточности условия (i). Непосредственно убеждаемся, что

$$D_1(x) = I_1 \bar{D}(x) I_1 = I_1 \bar{D}^\perp(-x) I_1.$$

Тогда из условия (ii) и выражения для факторизации матрицы $G(x)$ в (0.1) получим

$$G_+(x) D(x) G_-(x) = A_+(x) \bar{G}_+^\perp(-x) I_1 D_1(x) I_1 \bar{G}_-^\perp(-x) A_-(x), \quad x \in R. \quad (2.7)$$

По теореме единственности для частных индексов и лемме 1 (первое равенство в (0.4)) из (2.7) следует, что

$$D_1 = D, \quad G_+(x) \Omega_+(x) = A_+(x) \bar{G}_+^\perp(-x) I_1, \quad x \in R, \quad (2.8)$$

где $\Omega_+(x)$ — некоторая матрица из $\mathcal{P}^+(R; \mathcal{K}_n)$. Из второго равенства в (2.8) при $x = \infty$ с учетом (2.6) и равенства $G_\pm(-\infty) = G_\pm(\infty)$ после элементарных преобразований получим (2.5). Далее доказательство полностью повторяет доказательство достаточности условия (i) начиная с равенства (2.5).

Необходимость условий (i) и (ii) очевидна. Критерий 2 доказан.

3. Доказательство теоремы 2. В частном случае, когда $G(\infty) = I$, теорема 2 непосредственно вытекает из критерия 2(ii) при $A_\pm = I$.

В общем случае ($G(\infty) \neq I$) матрица-функция $G_1(x) := G(x)G^{-1}(\infty)$ удовлетворяет условию (1.1) и $G_1(\infty) = I$. Тогда для $G_1(x)$ теорема 2 выполняется согласно критерию 2(ii) при $A_\pm = I$. Теорема 2 доказана.

4. Доказательство теоремы 3. Положим

$$U(x) := \frac{1}{d(x)} \begin{pmatrix} u_1(x) & u_2(x) \\ -\bar{u}_2(x) & u_1(x) \end{pmatrix}, \quad (4.1)$$

где $u_1, u_2 \in W^{1 \times 1}$, $\text{Im } u_1 = 0$, $u_1(x) = u_1(-x)$, $u_2(x) = u_2(-x)$,

$$d(x) = ((u_1(x))^2 + |u_2(x)|^2)^{1/2} \neq 0, \quad x \in R.$$

Тогда можно видеть, что матрица U в (4.1) удовлетворяет условию (1.1) и, следовательно, для нее справедлива теорема 2. Значит, все частные индексы матрицы $U(x)$ равны нулю. Следовательно, все частные индексы матрицы $G(x) := d(x)I_2U(x)$, где $I_2 = \{1, -1\}$ — диагональная матрица, также равны нулю ввиду того, что $\text{Ind } d(x) = 0$ по построению. Теорема 3 доказана.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Feldman I., Gohberg I., Krupnik N.* Convolution equations on finite intervals and factorization of matrix functions // *Integr. Equations Oper. Theory.* 2000. V. 36. P. 201–211.
2. *Мухелишвили Н. И.* Сингулярные интегральные уравнения. М.: Наука, 1968.
3. *Гахов Ф. Д., Черский Ю. И.* Уравнения типа свертки. М.: Наука, 1978.
4. *Гахов Ф. Д.* Краевая задача Римана для системы n пар функций // *Успехи мат. наук.* 1954. Т. 7, № 4. С. 3–54.
5. *Литвинчук Г. С.* Краевые задачи и сингулярные интегральные уравнения со сдвигом. М.: Наука, 1986.
6. *Тахтаджян Л. А., Фаддеев Л. Д.* Гамильтонов подход в теории солитонов. М.: Наука, 1986.
7. *Захаров В. Е., Манаков С. В., Новиков С. П., Питаевский Л. П.* Теория солитонов: Метод обратной задачи. М.: Наука, 1980.
8. *Боровков А. А.* Теория вероятностей. М.: Наука, 1999.
9. *Шмудьян Ю. Л.* Задача Римана с положительно определенной матрицей // *Успехи мат. наук.* 1953. Т. 8, № 2. С. 143–145.
10. *Гохберг И. Ц., Крейн М. Г.* Системы интегральных уравнений на полупрямой с ядрами, зависящими от разности аргументов // *Успехи мат. наук.* 1958. Т. 13, № 2. С. 3–72.
11. *Спитковский И. М., Николайчук А. М.* Факторизация эрмитовых матриц-функций и ее приложения к граничным задачам // *Укр. мат. журн.* 1975. Т. 27, № 6. С. 767–779.
12. *Rabindranathan M.* On the inversion of Toeplitz operators // *J. Math. Mech.* 1969. V. 19, N 3. P. 195–206.
13. *Тишин П. М.* Критерий устойчивости частных индексов круговой матрицы-функции // *Мат. заметки.* 1988. Т. 44, № 4. С. 536–545.
14. *Литвинчук Г. С.* Две теоремы об устойчивости частных индексов краевой задачи Римана и их приложение // *Изв. вузов. Математика.* 1967. Т. 67, № 12. С. 47–57.
15. *Воронин А. Ф.* О корректности краевой задачи Римана с матричным коэффициентом // *Докл. РАН.* 2007. Т. 414, № 2. С. 156–158.

Статья поступила 30 июля 2009 г.

Воронин Анатолий Федорович
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,
пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090
voronin@math.nsc.ru